



ណែនាំពិសោធន៍ជីវវិទ្យា



វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ឆ្នាំ២០២៣

គណៈកម្មការអូកនិពន្ធ ៖ លោក ផែន សារិត
លោកស្រី ម៉ែន ភក្ដី

លោកស្រី ឈូក ណាស្រស់

គណៈកម្មការរបបនាទំព័រ ៖ លោកស្រី ឈុំ ពៅ

លោក នៅ វុត្តា

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូទៅ

- ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឌី ខាំបូលី
- ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សៀង សុវណ្ណា
- ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហុង គីមជាង

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ

- ១.លោក ឌី បុណ្ណា
- ២.លោកស្រី ប៊ុន សុផានី
- ៣.លោកបណ្ឌិត ម៉ម ចាន់សៀន

បុព្វកថា

ដំណើរអភិវឌ្ឍន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ ជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យ បំផុតមួយដែលចាប់បួសគល់ចេញពីការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ការផ្សះផ្សារ ជាតិ ការកសាងមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃសន្តិភាពនិងស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្រោយពេល ដែលសន្តិភាពត្រូវបានកើតឡើងដោយបរិបូណ៌នៅឆ្នាំ១៩៩៨ កម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គឺ ប្រមាណ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីប្រមាណ៥៣% នៅឆ្នាំ២០០៤ មកនៅទាបជាង១០% នៅឆ្នាំ២០១៩។ ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិជាសកម្មភាពដែល បន្តទៅមុខជាប់ជានិច្ច ហើយគោលនយោបាយថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យគ្របដណ្តប់ ក៏កំពុង លេចរូបរាងឡើង ដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ និងឈានឡើងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃ និម្មាបនកម្មពិភពលោកនិងតំបន់ រួមទាំងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បានផ្តល់កាលានុវត្តភាព សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងបន្តពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅ រកការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ឱ្យ ស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ច ថ្មីៗ។ ដើម្បីចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី ៤ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុង ផុសផុលឡើង ប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្សីដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មី នវានុវត្តន៍ ការ ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវតែមានការកែលម្អ។

បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងនាំមុខក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ដោយ មានភាគហ៊ុនប្រមាណ ៤៤% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក។ ប្រទេសចិនកំពុងបន្ត កសាង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង និងអាហ្វ្រិក កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការវិនិយោគនេះ ហើយជាលទ្ធផល ប្រទេសទាំងនោះក៏ពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែរ។ ទុនវិនិយោគ សរុបលើការស្រាវ ជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិក មានប្រមាណ៥% នៃការវិនិយោគ ទាំងមូលរបស់ពិភពលោក ក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំង២នេះមានប្រជាជនប្រមាណ ២០%នៃប្រជាជន ពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន៦ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើ ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែល ស្មើនឹងប្រមាណ ៧០%នៃទុនវិនិយោគសរុបរបស់ពិភពលោក។

តើចំណេះដឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីទាំងនេះកើតឡើងពីអ្វី? ហើយកើតឡើងដោយ របៀបណា? ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទទួល និងប្រកួត ប្រជែងក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ ហើយដែលប្រការនេះ ចាំបាច់តម្រូវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា ត្រូវក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋឌីជីថល ពលរដ្ឋសកល និងពលរដ្ឋដែល ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិដើម្បី

ទទួលបានមនុស្សធម៌ និងរួមចំណែកក្នុងកំណើន។ ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២នូវបម្លាស់ប្តូរនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច ពីសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម និងធនធានអតិកម្ម (Labour and Resource Based Economy) ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិ (Knowledge Based-Economy) ដែលក្នុងន័យនេះ ពុទ្ធិគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅលើគន្លង ដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការ ផលិត ជ្រើសរើស បន្ត បង្កើតមុខរបរ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិ ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃកំណើន និងកែលម្អ ជីវភាពរស់នៅ។ សមត្ថភាពទាំងនេះ អាចកើតឡើងនៅពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាមាន ឱកាសក្នុងការទទួល បានបទពិសោធន៍ពីការស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត និងការស្វែងរក នវានុវត្តន៍។

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ គឺជាការត្រួតត្រាសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រកប ដោយពុទ្ធិ និងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពរស់រវើក។ តាមរយៈមូលដ្ឋានអប់រំ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ នឹងប្រមូលផ្តុំ បង្កើត និងចែករំលែក ទៅកាន់សមាជិកក្នុងសង្គមនូវសម្បទាអប់រំ ពិសេសគឺពុទ្ធិសម្បទា ក្នុងបុព្វហេតុនៃមនុស្សជាតិ និងឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេស។ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ គឺពុំគ្រាន់តែជា សង្គមដែលសម្បូរព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ តែជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបរិវត្តកម្មព័ត៌មានទៅជា មូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងតំណភ្ជាប់ បាន ពង្រីកព្រំដែននៃការចូលទៅកាន់ និងការទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ហើយដែលក្នុងន័យនេះ ការ អប់រំនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខនិងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ សង្គមមួយដែលមានអំណាន និងរបាប់ជាបុរេលក្ខខណ្ឌ នៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋ ពេលនោះបំណិននៃអំណាន និងនិពន្ធ និងការគណនាលេខនព្វន្ត គឺជា ចលករនៃការរៀនរបស់សិស្ស។ ធាតុដ៏ចម្បងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកសាងសង្គមដែលប្រកបដោយ ពុទ្ធិគឺសៀវភៅសិក្សា ហើយការរៀបរៀង និងនិពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សាជាប្រចាំ គឺជានវានុវត្តន៍នៃ វិស័យអប់រំដែលនាំទៅរកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ការអភិវឌ្ឍសម្បទាអប់រំ និងការចែករំលែកចំណេះ ដឹង។ មូលដ្ឋានអប់រំ ជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវមានគុណភាពដែលប្រកបដោយការឆ្លើយតប ចំពោះតម្រូវការខាងលើនេះ។ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំត្រូវបន្តសិក្សាជាប់ជានិច្ច តាមរយៈការរៀបរៀង និងនិពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ហើយដែលសៀវភៅសិក្សាទាំងនេះនឹងក្លាយ ជា ស្ថាននៃទំនាក់ទំនងរវាងនវានុវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា និងការរៀននិងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

សង្គមដែលប្រកបពុទ្ធិ ក៏ជាសង្គមដែលបណ្តុះឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹង ផ្អែក លើពុទ្ធិដែរ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃបែបផែននេះរួមមាន Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិក សួនឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសយានយន្តនិងយានយន្តនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ តំបន់ ជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា តំបន់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសារ គមនាគមន៍ ឌីជីថលនៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជាសួនឧស្សាហកម្មថាមពល និង ឥន្ធនគីមីសាស្ត្រនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ហើយក៏នៅមានទីក្រុងនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃទីក្រុងទាំងនេះគឺការប្រើប្រាស់និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញ និងតម្រង់ទិស ដោយចំណេះដឹង ហើយដែលចំណេះដឹងទាំងនោះកើតចេញជាដំបូងពីការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះស្ថាន ឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃជំនាញជាន់ខ្ពស់ ការប្រកួតប្រជែងដោយគុណ

ធិបតេយ្យ និង ជាពិសេសគឺការបណ្តុះបណ្តាលអំណាននិងនិពន្ធសៀវភៅ។ ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែក ពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងមានសន្ទុះលឿនជាងអ្វីដែលសិស្ស និងនិស្សិតអាចទទួលបានពីគ្រូនៅ គ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលធ្វើឱ្យគោលដៅនៃការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានការប្រឈមខ្លាំងជាងពេល ណាទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំ មានសៀវភៅជាង២,២លានចំណងជើង ត្រូវបានសរសេរ និង បោះពុម្ព ដែលក្នុងនោះប្រទេសចិនមាន៤៤០ពាន់ ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន ៣០៥ពាន់ និង ប្រទេសរុស្ស៊ីមាន ១២០ពាន់ចំណងជើង។

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ មធ្យោបាយសម្រាប់អំណានក៏មាន ច្រើន ជម្រើសសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជន រួមមានការអានសៀវភៅ ការអានលើ ឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិក ការអានដោយប្រើទូរសព្ទវីឌេអូ និងការអានលើកុំព្យូទ័រ ដែលសុទ្ធសឹងជា មធ្យោបាយសំខាន់ៗដែលនាំអ្នកអានទាំងឡាយឱ្យសម្រេចគោលបំណងអានរបស់ខ្លួន។ ម្យ៉ាងវិញ ទៀត អំណានដោយប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ចំណាយពេលតិច ងាយស្រួលអាន និងជួយដល់ បរិស្ថានមួយកម្រិតទៀត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់ អំណានកំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអំណានទាំងនេះ។ បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសជឿនលឿន ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណា អំណានតាមរយៈសៀវភៅនៅតែមានសន្ទុះដដែល។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បច្ចេកវិទ្យាអានបែបទំនើបតាមរយៈឧបករណ៍ទំនើប អាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃធនធាន អប់រំឌីជីថល និងមាតិកាឌីជីថលគ្រប់គ្រាន់ដែលបានផលិត និងបង្ហោះចែកចាយសម្រាប់អំណាន។

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជំរុញឱ្យមានបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងអេកូស៊ីស្តែមនៃការអប់រំ ជាពិសេសការ អប់រំ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីលើកកម្ពស់អំណាន តាមរយៈការផលិត មាតិកាឌីជីថលដែលមានភាពចម្រុះ ការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកតំណភ្ជាប់និងវេទិកាឌីជីថល ការពង្រីក វិសាលភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតធនធានអប់រំឌីជីថល គួបផ្សំ ជាមួយការចែកសន្លឹកកិច្ចការឱ្យសិស្សយកទៅរៀននៅផ្ទះ និងការចុះទៅជួបជាមួយសិស្សជា បណ្តុំនៅតាមសហគមន៍។ ក្នុងន័យលើកកម្ពស់អំណាន និងភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសៀវភៅសិក្សា ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពសក្តិសិទ្ធិ និងផ្តល់ឱកាសអំណានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់ សិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាលើកទឹកចិត្តនូវចំណុចមួយ ចំនួនដូចខាងក្រោម៖

1. សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំ សូមបន្តនិងបង្កើនការបោះពុម្ពស្នាដៃបន្ថែម ទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យធនធានសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប ជាពិសេសធនធានអំណាន ជាខេមរភាសា
2. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ ថ្នាក់ និង និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចចូលរួមអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់លទ្ធភាព ជាមួយធនធានអំណាន ជាពិសេសការរៀបចំឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់សហសិក្សា និង អំណានក្នុងបណ្ណាល័យ

3. សាស្ត្រាចារ្យតាមមុខវិជ្ជា និងអ្នកស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឬវិស័យ ត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀនបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវដែលមានដាក់បញ្ចូលកិច្ចការស្វ័យសិក្សា សហសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យដែលតម្រូវឱ្យនិស្សិត ត្រូវអាននិងស្រាវជ្រាវជាមួយធនធានអំណាន
4. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតបណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាឯកសារ ឬមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថល ជាដើម ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា អាចទទួលបាន និងស្វែងរកប្រភពសម្រាប់អំណាន កាន់តែសម្បូរបែប និងមានភាពបត់បែន ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអ្នកអាន
5. និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា ត្រូវខិតខំនិងចំណាយពេលអាន និងចាត់ទុកវប្បធម៌ និងអកប្បកិរិយាអំណានជាផ្នែកមួយ នៃពេលវេលានិងភាពស៊ីវិល័យនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
6. បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល សូមជួយជំរុញនិងបង្កលក្ខណៈកាន់តែ ច្រើនថែមទៀត ជាពិសេសការលើកចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈសិក្សា សៀវភៅអាន និងឧបករណ៍សម្រាប់អំណានដល់កូនៗ ដែលចាត់ទុកជាការវិនិយោគមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់ បង្កើនចំណេះដឹង និងអនាគតរបស់ពួកគេ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ដែលហៅកាត់ថា “មូលនិធិ ស.គ.ន” និងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Research Creativity and Innovation Fund ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា “RCI Fund”។ គោលដៅចម្បងនៃមូលនិធិនេះ គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្ត ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលការុបនីយកម្ម។ មូលនិធិ ស.គ.ន បានសម្រេចកំណត់ប្រធានបទ ជាអាទិភាពសម្រាប់ការគាំទ្រដោយមូលនិធិចំនួន៣ រួមមាន ឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ (Digitalization for IR.4.0) ការស្រាវជ្រាវអនុវត្តលើវិស័យកសិកម្ម (Applied Agricultural Research) និងការស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យសតវត្សទី២១ (21st Century Pedagogy Research) ។

ដោយមានការធ្វើអាទិភាពរូបនីយកម្មទៅលើទិសដៅនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា (Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ គោលបំណងនៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសាជូនដល់និស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ លើសពីនេះទៀតការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា មានគោលដៅដូចខាងក្រោម ៖

- ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិតនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា

- លើកកម្ពស់ទំនើបការវប្បធម៌និងវិជ្ជាជីវៈ និងឧត្តមានុវត្តន៍នៃការរៀននិងបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវ នៅលើមុខវិជ្ជា កម្មវិធីសិក្សា ឬមុខជំនាញជាក់លាក់
- បង្កើនភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការកសាងវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យ និង អ្នកស្រាវជ្រាវ
- រួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និង វប្បធម៌នៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះជំហានប្រកបដោយមនសិការ វិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រឹងសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជា ខេមរភាសា ជូននិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងជាធនធាន សិក្សាដែលជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្រៀន និងរៀន ហើយត្រូវមានបរិមាណ គ្រប់គ្រាន់ ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ និងតម្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាគោលការណ៍ គ្រឹះស្ថានឧត្តម សិក្សាទាំងអស់ ត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាដែលប្រើជាគោលសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ។ ចំនួនសៀវភៅ សិក្សាដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សារបស់និស្សិត ត្រូវមានយ៉ាងតិចមួយចំណង ជើងក្នុងមួយមុខវិជ្ជា ហើយត្រូវតម្កល់យ៉ាងតិច២ច្បាប់ នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ឬអាចរកបានតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតជូនដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា រដ្ឋ និងឯកជនដែលបានស្នើសុំថវិកាមូលនិធិរួច សូមចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនចំណងជើង សៀវភៅ។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំ សូមចូលរួម ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការដ៏ទទួល និងថ្លៃថ្នារនៃនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅ កម្រិតឧត្តមសិក្សា។

សេចក្តីបញ្ជាក់

នៃមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

សៀវភៅសិក្សានេះជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំអនុវត្តថវិកាមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគម្រោងរៀបរៀង និងនិងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិត **ឧត្តមសិក្សា**។ សៀវភៅសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបរៀង និងនិង ឬកែលម្អដោយមានការធានាអះអាងថាជា ស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ និងបានឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សា អប់រំ ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ឬក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតម្លៃស្មើនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងតាមរយៈកិច្ច សន្យាដែលបានធ្វើឡើង និងដែលបានតម្កល់ទុកនៅមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុ វត្តន៍។ រាល់ខ្លឹមសារ ការបកស្រាយ និងរូបភាព គឺជាជំហរនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ ហើយ ពុំ ឆ្លុះបញ្ចាំង ឬជាតំណាងដល់មូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុ វជន និងកីឡា ឡើយ។

មាតិកា

បុព្វកថា.....	i
សេចក្តីបញ្ជាក់	vi
អារម្ភកថា	x
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ	xi
ការបរិយាយលើមុខវិជ្ជា.....	xii
សេចក្តីសង្ខេបនៃសៀវភៅ	xiv
សេចក្តីផ្តើម	1
ជំពូក១ ៖ មេរៀនពិសោធថ្នាក់ទី១០	3
១.១.មេរៀនពិសោធទី១.....	3
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍.....	3
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	4
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	6
១.២.មេរៀនពិសោធទី២	7
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍.....	7
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	9
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	11
១.៣.មេរៀនពិសោធទី៣.....	12
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍.....	12
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	14
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	17
១.៤.មេរៀនពិសោធទី៤.....	19
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍.....	19
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	20
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	22
១.៥.មេរៀនពិសោធទី៥.....	23
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍.....	23
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	24
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	27
ជំពូក២ ៖ មេរៀនពិសោធថ្នាក់ទី១១	29
២.១.មេរៀនពិសោធទី១	29
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍.....	29
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	30

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	31
២.២.មេរៀនពិសោធទី២	33
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធទី១	33
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	34
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	37
២.៣.មេរៀនពិសោធទី៣	39
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធទី១	39
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	40
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	43
២.៤.មេរៀនពិសោធទី៤	45
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធទី១	45
ផ្នែកទី២ ៖ សេចក្តីណែនាំសន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	47
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	49
២.៥.មេរៀនពិសោធទី៥	50
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធទី១	50
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	51
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	53
ជំពូក៣ ៖ មេរៀនពិសោធថ្នាក់ទី១២	56
៣.១.មេរៀនពិសោធទី១	56
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធទី១	56
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	56
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	59
៣.២.មេរៀនពិសោធទី២	61
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធទី១	61
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	62
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	65
៣.៣.មេរៀនពិសោធទី៣	66
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធទី១	66
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	69
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	72
៣.៤.មេរៀនពិសោធទី៤	75
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើកិច្ចការពិសោធទី១	75
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	78

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	82
៣.៥.មេរៀនពិសោធទី៥	85
ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើកិច្ចការពិសោធដ្រើង	85
ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ	86
ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស	89
សេចក្តីសន្និដ្ឋានរួម	93
គន្ថនិទ្ទេស	94

លោកថា

សៀវភៅណែនាំពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យានេះ ជាសមិទ្ធិផលថ្មីមួយទៀតបន្ថែមទៅលើឯកសារផ្សេងៗទៀតស្តីពីការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលបាននិពន្ធ ផលិត និងចងក្រងក្រោមការជ្រោមជ្រែងពីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា រួមជាមួយដៃគូសហការផ្សេងៗនាពេលកន្លងទៅ។ សៀវភៅនេះជាជំនួយដ៏សំខាន់ចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឯកទេសជីវវិទ្យា ដែលកំពុងបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលើបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំមេរៀន និងដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀន និងក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។ លក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឱ្យសៀវភៅណែនាំពិសោធន៍នេះខុសប្លែកពីសៀវភៅ ឬឯកសារពិសោធន៍នោះគឺការបង្ហាញនូវចំណុចលម្អិតនៃវិធីសាស្ត្រពិសោធន៍ បម្រុងប្រយ័ត្នមួយចំនួនដែលកើតមាននាពេលដំណើរការពិសោធន៍ រួមទាំងខ្លឹមសារណែនាំសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតដែលជួយបំពេញភារកិច្ចចន្លោះដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។

ប្រធានបទពិសោធន៍សរុបទាំង១៥នៅក្នុងសៀវភៅនេះ ត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីខ្លឹមសារពិសោធន៍ទាំងបីកម្រិតថ្នាក់នៃសៀវភៅសិក្សាគោលជីវវិទ្យារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាទាំងអស់។ ការសម្រេចជ្រើសរើសយកខ្លឹមសារពិសោធន៍ទាំង១៥ប្រធានបទនេះ គឺផ្អែកទៅលើការស្ទង់មតិរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដែលបាន និងកំពុងបង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យានៅតាមវិទ្យាល័យនានាក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ព្រៃវែង តាកែវ និងកំពង់ឆ្នាំង ដោយផ្អែកទៅលើតម្រូវការចាំបាច់ ភាពឆ្លើយតប និងការលំបាកនៃការធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្តែងរបស់ពួកគាត់នៅតាមមូលដ្ឋាន។ លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងនោះបានបង្ហាញថាពួកគាត់បានជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជា ខ្វះវិធីសាស្ត្រ ខ្វះឬពិបាកក្នុងការស្វែងរកធាតុសម្ភារពិសោធន៍ និងមានភាពលំបាកក្នុងការសរសេរសន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់សិស្សជាដើម ដែលជាឧបសគ្គរារាំងដល់សកម្មភាពដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍របស់ពួកគាត់។

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាក្រុមអ្នកនិពន្ធនឹងចាំទទួលនូវរាល់មតិយោបល់ និងគំនិតល្អៗពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដើម្បីចូលរួមចំណែកកែលម្អនូវរាល់ចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះ។

ថ្ងៃអង្គារ១កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣

អ្នកនិពន្ធ

លោក ផែន សារិត លោកស្រី ឈូក ណាស្រស់ លោកស្រី ម៉ែន ភក្តី

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ជាការពិតសៀវភៅ « ណែនាំពិសោធន៍ជីវវិទ្យា » ដែលលេចចេញជាមួយរូបរាងនៅពេលនេះគឺបានកើតឡើងពីការខិតខំ និងយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមពីភាគី និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើន។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតបំផុតដល់ភាគី និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជា៖

- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឱ្យបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ហៅកាត់ថា «មូលនិធិ ស.គ.ន»។

- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា «មូលនិធិ ស.គ.ន» ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្ត ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលភារូបនីយកម្ម។

- មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលបានគាំទ្រដល់ការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា (Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសាជូនដល់និស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

- វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំដែលបានចាត់តាំងជាគណៈកម្មការនិពន្ធ និងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យលើស្នាដៃនៃការចូលរួមការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សានេះ។

- ឯកឧត្តមនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ដែលព្រមព្រៀងទទួលសិទ្ធិជាតំណាងអ្នករៀបរៀងក្នុងការចាត់ចែង និងសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចដំណើរការទូទាត់ថវិកា តាមរយៈការស្នើសុំ និងទទួលថវិកា បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយបន្តនូវស្នាដៃរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អរបស់អ្នករៀបរៀង ក្នុងការរៀន និងបង្រៀន ក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សា និងប្រគល់សិទ្ធិស្របតាមការកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា ក្រោមការគាំទ្រនៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។

- គ្រូឧទ្ទេសមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំដែលបានផ្តល់មតិកែលម្អលើខ្លឹមសារនៃមេរៀននីមួយៗឱ្យកាន់តែមានភាពសុក្រឹត និងមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា សៀវភៅនេះនឹងឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិត នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ការបរិយាយលើមុខវិជ្ជា

សៀវភៅណែនាំពិសោធន៍ជីវវិទ្យានេះបានរៀបរៀង និងនិពន្ធឡើងស្របទៅនឹងមេរៀនពិសោធន៍នៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ដោយបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅសិក្សាគោលទាំងបីកម្រិតថ្នាក់រួមមានថ្នាក់ទី១០ ទី១១ និងថ្នាក់ទី១២។ នៅក្នុងកម្រិតសិក្សានីមួយៗត្រូវបានជ្រើសរើសយកប្រាំប្រធានបទពិសោធន៍នៅក្នុងចំណោមមេរៀនពិសោធន៍ទាំងអស់។ សៀវភៅនេះត្រូវបានបែងចែកជាបីជំពូកដែលរួមមានជំពូកទី១បង្ហាញពីមេរៀនពិសោធន៍ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី២មេរៀនពិសោធន៍ថ្នាក់ទី១១ និងជំពូកទី៣មេរៀនពិសោធន៍ថ្នាក់ទី១២។ នៅក្នុងមេរៀនពិសោធន៍មួយៗត្រូវបានចែកចេញជាបីផ្នែកសំខាន់ៗរួមមាន៖

- ផ្នែកទី១ ការណែនាំពិសោធន៍៖ ជាសន្លឹកកិច្ចការមួយដែលបង្ហាញពីការណែនាំដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅមុនពេលដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍។ ផ្នែកនេះផ្តោតទៅលើការណែនាំលើសន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់សិស្ស និងសន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់គ្រូនូវគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងការសរសេរ និងចំណុចបន្ថែមផ្សេងៗទៀតលើដំណើរការពិសោធន៍ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖ ការកំណត់វត្ថុបំណង ការបង្កើតសំណួរគន្លឹះ សម្ភារពិសោធន៍ ដំណើរការពិសោធន៍ ការវិភាគលទ្ធផល និងការសន្និដ្ឋាន។
- ផ្នែកទី២ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់គ្រូ៖ ជាសន្លឹកកិច្ចការមួយដែលបង្ហាញពីគន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់ជំនួយស្មារតីបន្ថែមលើចំណេះដឹងមានស្រាប់របស់គ្រូក្នុងការដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍។ នៅក្នុងផ្នែកនេះគ្រូត្រូវរៀបចំខ្លឹមសារ និងដំណើរការពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅមុនពេលដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀន ឬក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។ ផ្នែកទី២ នេះក៏មានលំនាំដូចគ្នាទៅនឹងផ្នែកទី១ផងដែរ។
- ផ្នែកទី៣ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់សិស្ស៖ ជាសន្លឹកកិច្ចការមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវផ្តល់ឱ្យសិស្សនៅក្នុងពេលធ្វើពិសោធន៍។ ចំណុចខ្លះនៃសន្លឹកកិច្ចការមានទម្រង់ជាការបំពេញចន្លោះបន្ទាត់ទៅលើលំនាំនីមួយៗនៃការធ្វើពិសោធន៍។

ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំពិសោធន៍នេះ សូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកចិត្តទុកដាក់ដូចខាងក្រោម៖

- សូមអានទំព័រ “ការណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់សៀវភៅ” នេះឱ្យបានច្បាស់ជាមុនសិន
- សូមអានផ្នែកទី២ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់គ្រូឱ្យបានច្បាស់លាស់
- សូមអានផ្នែកទី៣ សន្លឹកកិច្ចការរបស់សិស្សឱ្យបានច្បាស់លាស់
- សូមអានផ្នែកទី១ សេចក្តីណែនាំលើសន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់សិស្សឱ្យបានច្បាស់លាស់
- ការងារបន្ទាប់ គឺការអនុវត្តធ្វើពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងជាមុនសិនមុនពេលដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍ក្នុងថ្នាក់ ឬក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍
- ការងារចុងក្រោយគឺដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍។



តារាង 1 សង្ខេបលំហូរការងាររបស់គ្រូសម្រាប់ដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍ ដើម្បីរៀបចំមេរៀនពិសោធន៍មួយៗឱ្យបានល្អ សូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុវត្តតាមជំហានៗដូចខាងក្រោម៖

- ជំហានទី១ ការធ្វើផែនការពិសោធន៍៖ លោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀបចំសម្ភារពិសោធន៍ទៅតាមប្រធានបទពិសោធន៍មួយៗថាតើត្រូវមានអ្វីខ្លះ? ត្រូវស្វែងរកសម្ភារពីប្រភពណាខ្លះ? តើសម្ភារអ្វីខ្លះមិនចាំបាច់ទិញ (អាចរកបាន) ហើយសម្ភារអ្វីខ្លះត្រូវទិញ? ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវទិញសម្ភារខ្លះ សូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើតារាងរាយប្រភេទសម្ភារទាំងនោះ រួមទាំងតម្លៃប៉ាន់ស្មានឱ្យបានច្បាស់លាស់។
- ជំហានទី២ ការរៀបចំឯកសារធ្វើការពិសោធន៍៖ សូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀបចំឯកសារតាមលំនាំនៃផ្នែកទី២ (សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ) តាមជំហាននីមួយៗនៃការពិសោធន៍ (ការកំណត់វត្ថុបំណង សំណួរគន្លឹះ សម្មតិកម្ម ដំណើរការពិសោធន៍ វិភាគលទ្ធផល និងសន្និដ្ឋាន)។ បន្ទាប់មកគឺការផលិតសន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស (ដូចក្នុងផ្នែកទី៣) សម្រាប់ចែកឱ្យសិស្សក្នុងពេលធ្វើពិសោធន៍។
- ជំហានទី៣ ការដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍៖ ជាដំណាក់កាលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀន ឬក្នុងទីពិសោធន៍។

សេចក្តីសង្ខេបនៃសៀវភៅ

សៀវភៅ ណែនាំពិសោធន៍ជីវវិទ្យាប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្រៀន និងរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងបានរកឃើញវាហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការរៀបចំណែនាំការពិសោធន៍ដែលត្រូវបានបង្ហាញដើម្បីជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សមានដូចជា៖

- បង្ហាញពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៅក្នុងការដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍
- ពន្យល់ពីរបៀបនៃការសរសេរសន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់សិស្សឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
- បកស្រាយវិធីសាស្ត្រលម្អិតសម្រាប់ធ្វើពិសោធន៍
- ពិពណ៌នាការផលិត ស្វែងរក និងប្រើប្រាស់សម្ភារពិសោធន៍ងាយៗប្រកបដោយគុណភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវ
- បង្ហាញពីបម្រុងប្រយ័ត្នមួយចំនួននៅក្នុងពេលធ្វើពិសោធន៍។

សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងយុគសម័យនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្ម ៤.០ និន្នាការនៃការអប់រំរបស់សកលលោកគឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំជំនាញ នវានុវត្តន៍ និងបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីផលិតធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព ពោលគឺការបណ្តុះបណ្តាលសិស្សានុសិស្ស ឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋផលិត។ ចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺការប្រែក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ២០៥០។ ដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឱ្យសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យខាងលើនេះ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន បានដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកំណែទម្រង់ជាច្រើនរួមមាន កំណែទម្រង់គ្រូបង្រៀន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ វិធីសាស្ត្របង្រៀន និងកំណែទម្រង់លើកម្មវិធីសិក្សាជាដើម។ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាព និងប្រសិទ្ធផលនៃការអប់រំជាចំណែកមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀន ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការតម្លើងប្រាក់បៀវត្ស និងការផ្តល់នូវភាគលាភផ្សេងៗទៀត។ ការអភិវឌ្ឍផ្នែកគុណវុឌ្ឍិរបស់គ្រូបង្រៀនតាមរយៈយន្តការនៃការបណ្តុះបណ្តាលដំបូង និងបន្តនឹងជួយឱ្យគុណភាពនៃការអប់រំមានភាពប្រសើរឡើង។ ការអភិវឌ្ឍលើកម្មវិធីសិក្សានៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈ ដែលរួមមានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសៀវភៅសិក្សាគោលនៅតាមគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងការធ្វើទំនើបកម្មលើកម្មវិធីសិក្សាលម្អិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាក៏ជាចំណែកមួយផងដែរនៅក្នុងការជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំ។

ក្រៅពីយន្តការខាងលើ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្នែកស្រាវជ្រាវលើបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ជាយន្តការដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានៃពិភពលោកដែលកំពុងមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើបញ្ហាសិប្បនិម្មិត (Artificial Intelligent) រួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលកំពុងបម្រើឱ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សលោក។ សមិទ្ធផលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់លើគ្រប់វិស័យរួមមានដូចជា វិស័យសេដ្ឋកិច្ច យោធា ឧស្សាហកម្ម សុខាភិបាល វេជ្ជសាស្ត្រ កសិកម្ម ឧស្សាហកម្មអាហារ សង្គមកិច្ចសាសនា សិល្បៈ និងវប្បធម៌ជាដើមគឺសុទ្ធសឹងពឹងផ្អែកទៅលើការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល។

ការផ្លាស់ប្តូរនូវផ្នត់គំនិត និងឥរិយាបថបែបថ្មីនៃការរៀន និងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្សតាមរយៈការអនុវត្តនូវយុទ្ធវិធី និងវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗតាមបែបស្ថាបនានិយមរួមមានវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបរិះរក (Inquiry-Based Learning) ការសិក្សាតាមបែបគម្រោង (Project-Based Learning) វិធីរៀន និងបង្រៀនបែបសហការ វិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែប 5E (5E-Teaching) និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ (Action Research) ជាកាតព្វកិច្ចអាជីពដែលត្រូវធ្វើជាប្រចាំនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន និងជួយឱ្យសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំ។ ការផ្លាស់ប្តូរនូវផ្នត់គំនិតតាមពាក្យស្លោក "ពីគ្រូបង្រៀនច្រើនសិស្សរៀនតិច ទៅគ្រូបង្រៀនតិចសិស្សរៀនច្រើន" និង/ឬពី "និយាយច្រើនធ្វើតិច ទៅនិយាយតិចធ្វើច្រើន" ជាយន្តការដែលនឹងជួយឱ្យសិស្ស និងគ្រូមានបំណិនកាយសម្បទា និងបញ្ញាបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។

ការអនុវត្តធ្វើពិសោធន៍ និងដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍ជាប្រចាំ គឺជាទម្លាប់ដែលឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរនូវសកម្មភាពរៀន និងបង្រៀនបែបសកម្ម ដោយផ្តល់ឱ្យសិស្សានុសិស្សនូវការគិតស៊ីជម្រៅតាមបែប

វិទ្យាសាស្ត្រទៅលើបាតុភូតធម្មជាតិដែលកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនពួកគេ។ ទម្លាប់នេះបន្តិចម្តងៗនឹងនាំឱ្យសិស្សានុសិស្ស មានបំណិនវិទ្យាសាស្ត្រគឺ ការគិតបែបតក្កវិជ្ជា ការសង្កេតច្បាស់លាស់ និងការដោះស្រាយ វិភាគបញ្ហា ឬបាតុភូតប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់ និងប្រាកដនិយម។ ចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការរៀន និងបង្រៀនតាមលំនាំខាងលើនេះ។ ពួកគាត់គឺជាកត្តាលើករ ឬជាអ្នកសម្របសម្រួល និងជាអ្នកច្នៃប្រឌិតដំណើរការ និងវិធីសាស្ត្របង្រៀនឱ្យមានភាពរស់រវើក និងសកម្ម។ ទាំងមុនពេល និងក្នុងពេលបង្រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូឈរលើពាក្យស្លោក “គ្រូជាប្រភពសំណួរ” និង/ឬ “គ្មានសំណួរគឺគ្មានចម្លើយ” ដោយផ្តល់នូវសំណួរគន្លឹះនៅក្នុងមេរៀន និងប្រភពសំណួរបំផុស ឬសំណួរជេញដោល ដើម្បីសម្រេចបាននូវវត្ថុបំណងមេរៀនប្រចាំថ្ងៃ។


ការស្វែងយល់នូវរបៀបនៃការគិតទៅលើវត្ថុបំណងមេរៀន ការបង្កើតនូវសំណួរគន្លឹះ ការច្នៃប្រឌិតនូវវិធីសាស្ត្រពិសោធន៍ និងការសរសេរសន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍សម្រាប់សិស្ស ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនអាជីពត្រូវមាន និងប្រតិបត្តិជាប្រចាំថ្ងៃ។ ភាពខ្វះចន្លោះនៃយុទ្ធវិធី ឬវិធីសាស្ត្រធ្វើពិសោធន៍មិត្តដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោល ឬឯកសារពិសោធន៍ផ្សេងៗទៀត ជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គផ្សេងៗទៀតដែលរារាំងដល់ការដឹកនាំសិស្សធ្វើពិសោធន៍របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមវិទ្យាល័យនានា ក្នុងពេលកន្លងមក។ ហេតុដូច្នេះការផលិតឯកសារ ឬសៀវភៅណែនាំបន្ថែមទៀតស្តីអំពីការធ្វើពិសោធន៍គឺជាការចាំបាច់ ដើម្បីជួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងដំណើរការរៀន និងការបង្រៀនឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ប្រយ័ត្ន!

ទី១: សូមប្រាប់សិស្សឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើការប្រើប្រាស់បន្ទះឡាម និងបន្ទះឡាម៉ែលពីព្រោះវាងាយបែកបាក់ហើយបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាមុតជាដើម។
ទី២: សូមប្រុងប្រយ័ត្នពេលយកកោសិកាខាងក្នុងសាច់ថ្កាស់។

- ខ. កោសិកាសត្វ**
- សម្ភារៈ**
- មីក្រូទស្សន៍អុបទិច បន្ទះឡាម បន្ទះឡាម៉ែល ឈើចាក់ឆ្មេញ ឬឈើសំប៉ែត ខ្សែរមទីវឡែន។
- ជំនំយ៉ាងណា**
- យកផ្នែកសំប៉ែតឈើចាក់ឆ្មេញ កោសថ្នមៗយកកោសិកាអេពីតេលរួមថ្កាស់នៅខាងក្នុងមាត់។ បន្ទាប់មកយកចុងឈើចាក់ឆ្មេញនោះផ្គិតថ្នមៗនៅលើបន្ទះឡាម។
 - បន្ថែមសូលុយស្យុងខ្សែរមទីវឡែនមួយតំណក់ហើយរង្វង់១-២វិនាទី។ បន្ទាប់មកយកបន្ទះឡាម៉ែលគ្របពីលើថ្នមៗ (កុំឱ្យមានពពុះខ្យល់)។
- ពិនិត្យមើលកោសិកាក្នុងមីក្រូទស្សន៍ដោយប្រើអុបសិចទិបលេខតូច (4x ឬ10x)។

សូមយកបិត្តទុកដាក់ មុននឹងកោសយកកោសិកាសូមណែនាំសិស្សឱ្យខ្មុរមាត់និងទឹកធម្មតាឱ្យបានស្អាត។



សូមណែនាំឱ្យសិស្សគ្របបន្ទះឡាម៉ែលពីលើបន្ទះឡាមថ្នមៗ ដោយដាក់តាមទម្រង់មុំ ៤៥ ដឺក្រេ ដើម្បីកុំឱ្យមានពពុះទឹក។

ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកអិច្វីការពិសោធរបស់គ្រូ

ប្រធានបទ សន្តោកកោសិកាសត្វ និងកោសិការុក្ខជាតិ

1. វត្ថុបំណង
សង្កេតពីទម្រង់ និងរូបរាងកោសិកាសត្វ និងកោសិការុក្ខជាតិ។
2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន
គ្រប់សារពាង្គកាយរបស់ការវិវត្តឡើងដោយកោសិកា។ កោសិកាទាំងអស់មានទំហំ និងរូបរាងខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទសារពាង្គកាយនីមួយៗ។ គេអាចធ្វើការសិក្សាសង្កេតពីទម្រង់កោសិកាបានតាមរយៈមីក្រូទស្សន៍អុបទិច។
3. ពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើកោសិកាសត្វ និងកោសិកាវត្តជាតិមានទម្រង់ និងរូបរាងដូចម្តេចខ្លះ ?

៣.២ សម្មតិកម្ម

៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

ក. កោសិកាវត្តជាតិ

សម្ភារ មីក្រូទស្សន៍អុបទិច បន្ទះឡាម បន្ទះឡាម៉ែល ពីប៉ែត ប្រអប់ប៉េទ្រី កូនកាំបិត ឡាមកោ ពុកមាត់ ឬមូលមុខលំពែង កាំបិតវះកាត់ (surgical blade) និងខ្លឹមបារាំង។



រូប 1.1 សម្ភារពិសោធន៍សង្កេតកោសិកាសត្វ និងកោសិកាវត្តជាតិ

ដំណើរការ

- យកមូលមុខលំពែងបកយកស្រទាប់កោសិកាខ្លឹមបារាំងផ្នែកខាងក្នុង រួចដាក់លើបន្ទះឡាម។
- បន្តក់ទឹកលើបន្ទះឡាមមួយតំណក់ រួចយកបន្ទះឡាម៉ែលគ្របពីលើ។
- សង្កេតកោសិកាខ្លឹមបារាំងដោយប្រើអុបសិចទីបលេខតូចជាងគេ បន្ទាប់មកបង្វិលដាក់អុបសិចទីបលេខធំបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីមើលឱ្យបានច្បាស់។ សង្កេតផ្នែកផ្សេងៗនៃកោសិកាវត្តជាតិ។

ខ. កោសិកាសត្វ

សម្ភារ

មីក្រូទស្សន៍អុបទិច បន្ទះឡាម បន្ទះឡាម៉ែល ឈើចាក់ធ្មេញ ឬឈើសំប៉ែត ខៀវមេទី ឡែន។


ដំណើរការ

- យកផ្នែកសំប៉ែតនៃឈើចាក់ធ្មេញ កោសចម្រុះយកកោសិកាអេពីតេលរួមថ្នាលនៅខាងក្នុងមាត់។ បន្ទាប់មកយកចុងឈើចាក់ធ្មេញនោះផ្គិតចម្រុះនៅលើបន្ទះឡាម។
- បន្ថែមសូលុយស្យុងខៀវមេទីឡែនមួយតំណក់ហើយរងចាំ១-២វិនាទី។ បន្ទាប់មកយកបន្ទះឡាម៉ែលគ្របពីលើចម្រុះ (កុំឱ្យមានពពុះខ្យល់)។
- ពិនិត្យមើលកោសិកាក្នុងមីក្រូទស្សន៍ដោយប្រើអុបសិចទីបលេខតូច (4x ឬ 10x)។

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល

លទ្ធផលនៃការពិសោធន៍បានបង្ហាញថាកោសិកាសាច់ថ្នាលផ្នែកខាងក្នុងមានរាងស្វី ហើយកោសិកាខ្លឹមបារាំងមានរាងជ្រុង។ កោសិកាវត្តជាតិមានភ្នាសគ្រោង ឬភ្នាសសែឡុយឡុស ចំណែកកោសិ

កាសត្វគ្មានទេ។ វាកុយអូលរបស់កោសិកាត្រួតជាតិមានទំហំធំ រីឯវាកុយអូលរបស់កោសិកាសត្វមានទំហំតូច។ ណ្វៃយ៉ូកោសិកាសត្វនៅចំកណ្តាលស៊ីតូប្លាស ឯណ្វៃយ៉ូកោសិកាត្រួតជាតិនៅផ្នែកចំហៀងនៃកោសិកា។



ទម្រង់កោសិកាអេពីតេលូមថ្ពាល់
(ពង្រីក 10x40)

ទម្រង់កោសិកាអេពីតេលូមខ្លឹមបារាំង
(ពង្រីក 10x40)

រូប 1.2 ទម្រង់កោសិការបស់ជាលិការសាច់ថ្ពាល់ និងកោសិកាខ្លឹមបារាំង

៣.៥ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ដូច្នេះកោសិកាសត្វ និងកោសិកាត្រួតជាតិមានទម្រង់ និងរូបរាងខុសគ្នាត្រង់កោសិកាសត្វមានរាងមូល ឬស្វ័យមានណ្វៃយ៉ូនៅចំកណ្តាល ហើយវាកុយអូលតូចៗ ចំណែកឯកោសិកាត្រួតជាតិមានរាងជ្រុង ឬពហុកោណ មានណ្វៃយ៉ូនៅចំហៀងនៃកោសិកា ហើយមានវាកុយអូលមួយធំ។

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ សង្កេតកោសិកាសត្វ និងកោសិកាត្រួតជាតិ

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីទម្រង់ និងរូបរាងកោសិកាសត្វ និងកោសិកាត្រួតជាតិ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

គ្រប់សារពាង្គកាយរបស់ការវស់បង្កឡើងដោយកោសិកា។ កោសិកាទាំងអស់មានទំហំ និងរូបរាងខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទសារពាង្គកាយនីមួយៗ។ គេអាចធ្វើការសិក្សាសង្កេតពីទម្រង់កោសិកាបានតាមរយៈមីក្រូទស្សន៍អុបទិច។

3. សំណួរគន្លឹះ

.....

4. សម្មតិកម្ម

តើកោសិកាសត្វ និងកោសិកាត្រួតជាតិមានទម្រង់ និងរូបរាងខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ? ចូរគូររូបសាកល្បង។

5. ដំណើរការពិសោធន៍

៥.១ កោសិកាត្រួតជាតិ

សម្ភារ មីក្រូទស្សន៍អុបទិច បន្ទះឡាម បន្ទះឡាម៉ែល ប្រអប់ប៉េទ្រី ពីប៉ែត កូនកាំបិត ឡាមកោពុកមាត់ ឬមូលមុខលំពែង កាំបិតវះកាត់ (surgical blade) និងខ្លឹមបារាំង។



ដំណើរការ

យកម្ជុលមុខលំពែងបកយកស្រទាប់កោសិកាខ្លឹមបារាំងផ្នែកខាងក្នុង រួចដាក់លើបន្ទះឡាម។

- បន្ទះកំទីកលើបន្ទះឡាមមួយតំណក់ រួចយកបន្ទះឡាមែលគ្របពីលើ។
- សង្កេតកោសិកាខ្លឹមបារាំងដោយប្រើអុបសិចទីបលេខតូចជាងគេ បន្ទាប់មកបង្វិលដាក់អុបសិចទីបលេខធំបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីមើលឱ្យបានច្បាស់។ សង្កេតផ្នែកផ្សេងៗនៃកោសិការុក្ខជាតិ។

៥.២ កោសិកាសត្វ

សម្ភារ

- មីក្រូទស្សន៍អុបទិច បន្ទះឡាម បន្ទះឡាមែល ឈើចាក់ធ្មេញ ឬឈើសំប៉ែត ខៀវមេទីឡែន។
- ដំណើរការ
- យកផ្នែកសំប៉ែតនៃឈើចាក់ធ្មេញ កោសថ្នមៗយកកោសិកាអេពីតេលរួមថ្កាស់នៅខាងក្នុងមាត់ បន្ទាប់មកយកចុងឈើចាក់ធ្មេញនោះផ្គិតថ្នមៗនៅលើបន្ទះឡាម។
 - បន្ថែមសូលុយស្យុងខៀវមេទីឡែនមួយតំណក់ហើយរងចាំ១-២វិនាទី។ បន្ទាប់មកយកបន្ទះឡាមែលគ្របពីលើថ្នមៗ (កុំឱ្យមានពពុះខ្យល់)។
 - ពិនិត្យមើលកោសិកាក្នុងមីក្រូទស្សន៍ដោយប្រើអុបសិចទីបលេខតូច (4x ឬ 10x)។

6. វិភាគលទ្ធផល

.....

.....

7. សន្និដ្ឋាន

.....

.....

១.២.មេរៀនពិសោធន៍២

សង្កេតប្រយុទ្ធសីតិកសាប


ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង
សង្កេតពីទម្រង់ និងរូបរាងផ្សេងៗរបស់ប្រូទីសទឹកសាប។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ប្រូទីសគឺជាជួរមួយក្នុងចំណោមជួរទាំងប្រាំរបស់ការវាស់វែង។ វាគឺជាមីក្រូសារពាង្គកាយឯកកោសិកា និងមួយចំនួនជាពហុកោសិកាអ៊ីការីយ៉ូត (ប្រូទីសរុក្ខជាតិ)។ ជួរ:ប្រូទីសរួមមាន ប្រូទីសសត្វ

ប្រូទីសរុក្ខជាតិ និងប្រូទីសឆ្មិត។ ប្រូទីសរុក្ខជាតិបង្កឡើងដោយធាតុកោសិកាភ្នំរ៉ូប្លាស និងផ្ទួលពន្លឺ ដែលជាលក្ខណៈខុសពីប្រូទីសសត្វ។




3. ណែនាំដំណើរការពិសោធន៍

វិធីត្រងយកប្រូទីសទឹកសាបៈ

ប្រើឧបករណ៍តម្រងប្រូទីសត្រីក្នុងទឹកចុះឡើងប្រាំៗដងក្នុងលក្ខខណ្ឌទីតាំង៖

យកពីតំបន់ផ្ទៃលើនៃទឹក
យកពីតំបន់កណ្តាលនៃកម្ពស់ទឹក
យកពីតំបន់ក្បែរបានបឹងព្រោះសម្បូរពួកអាមីប និងពួកនេម៉ាតូត



រូប1.4 ប្លង់ ឬទីតាំងសម្រាប់ដើម្បីត្រងយកប្រូទីសទឹកសាបៈ




រៀបចំមជ្ឈដ្ឋានប្រូទីសទឹកសាបៈ

- រៀបចំមជ្ឈដ្ឋាន ដាក់សារាយ ចក ឬរុក្ខជាតិទឹកផ្សេងទៀត ដែលអាចផលិតអុកស៊ីសែនក្នុងទឹកបាន
- ប្រើទឹកដែលយកមកពីមជ្ឈដ្ឋានប្រូទីសផ្ទាល់
- យកស្បែកត្រងដែលត្រងប្រូទីសរួចមកក្រឡកចូលក្នុងកែវដែលរៀបចំរួច
- ដាក់កែវប្រូទីសឱ្យត្រូវពន្លឺ ដើម្បីឱ្យរុក្ខជាតិធ្វើរស្មីសំយោគបាន



របៀបធ្វើសំណាកពិនិត្យតាមមីក្រូទស្សន៍



រូប 1.5 របៀបធ្វើសំណាកប្រូទីសទឹកសាបសម្រាប់ពិនិត្យតាមមីក្រូទស្សន៍

ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ

ប្រធានបទ សង្កេតប្រូទីសទឹកសាប

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីទម្រង់ និងរូបរាងផ្សេងៗរបស់ប្រូទីសទឹកសាប។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ប្រូទីសគឺជាជួរមួយក្នុងចំណោមជួរទាំងប្រាំរបស់ការវាស់។ វាគឺជាមីក្រូសារពាង្គកាយឯកកោសិកា និងមួយចំនួនជាពហុកោសិកាអ៊ីការីយ៉ូត (ប្រូទីសរុក្ខជាតិ)។ ជួរប្រូទីសរួមមាន ប្រូទីសសត្វ ប្រូទីសរុក្ខជាតិ និងប្រូទីសផ្សិត។ ប្រូទីសរុក្ខជាតិបង្កឡើងដោយធាតុកោសិកាក្លរ៉ូផ្លាស និងផ្តល់ពន្លឺដែលជាលក្ខណៈខុសពីប្រូទីសសត្វ។

3. ពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើប្រូទីសទឹកសាបមានទម្រង់ និងរូបរាងដូចម្តេចខ្លះ?

៣.២ សម្មតិកម្ម

ចូរគូរទម្រង់រូបរាងប្រូទីសទឹកសាប ។

៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ



រូប 1.6 សម្ភារពិសោធន៍ពីការសង្កេតប្រូទីសទឹកសាប

ដំណើរការ

- បន្តកំទេកត្រពាំងមួយតំណក់នៅលើបន្ទះឡាម រួចគ្របបន្ទះឡាមែលពីលើតំណក់ ទឹកនោះជួមៗកុំឱ្យកើតពពុះទឹក។
- យកមកពិនិត្យក្នុងមីក្រូទស្សន៍ដោយប្រើអុបស៊ុចទីបលេខតូចមុន(4X ឬ 10X)។

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល

ប្រូទីសសត្វ



ជាប់ញ៉ា (Daphnia)



ឌីយ៉ាតូមេ



ប៉ារ៉ាមេស៊ី



អាមីប

ប្រូទីសរុក្ខជាតិ



ប្រូទីសដូច រុក្ខជាតិ-សត្វ៖ អាចផ្លាស់ទីបាន



អីគ្លែន សារាយខៀវ-បៃតង

រូប 1.7 ទម្រង់ផ្សេងៗនៃប្រូទីសសត្វ និងប្រូទីសរុក្ខជាតិ

លទ្ធផលពិនិត្យតាមមីក្រូទស្សន៍បានបង្ហាញថាប្រូទីសទឹកសាបមាន ប្រូទីសសត្វមានចលនា និងអាចផ្លាស់ទីបាន និងមានប្រូទីសរុក្ខជាតិ ដែលមានប្លាស្ទិកក្លរូបក៏លសម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគ ដែលប្រូទីសរុក្ខជាតិភាគច្រើនមិនមានចលនាដើម្បីផ្លាស់ទីដោយខ្លួនឯងទេ។ ប្រូទីសដូចរុក្ខជាតិ-សត្វមានចលនាផ្លាស់ទីបាន ហើយមានក្លរូបក៏លសម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគបានទៀត។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

សន្និដ្ឋានថាប្រូទីសទឹកសាបមានទម្រង់ និងរូបរាងផ្សេងៗគ្នា ដែលប្រូទីសសត្វអាចផ្លាស់ទីបានតាមចលនាខុសគ្នា ឯប្រូទីសរុក្ខជាតិភាគច្រើនមិនមានចលនាទេ គឺវាផ្លាស់ទីបានដោយសារចរន្ត

ទឹក ប្រូទីសរុក្ខជាតិបង្កឡើងដោយធាតុកោសិកាក្លរូប្លាស្ទិកក្លរូប្លាស្ទិកមានពណ៌បៃតង ហើយប្រូទីសខ្លះ ដូចរុក្ខជាតិ-សត្វមានចលនាផ្លាស់ទីបាន មានទាំងក្លរូប្លាស្ទិកសម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគបានទៀត។ ដូច្នេះ ប្រភេទនីមួយៗសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសបង្កើតបានទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា ដែលធ្វើឱ្យរូបរាងនៃប្រភេទ នីមួយៗផ្សេងៗគ្នា។

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ សង្កេតប្រូទីសទឹកសាប

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីទម្រង់ និងរូបរាងផ្សេងៗរបស់ប្រូទីសទឹកសាប។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ប្រូទីសគឺជាជួររុក្ខជាតិមួយក្នុងចំណោមរុក្ខជាតិទាំងប្រាំរបស់ការវាស់។ វាគឺជាមីក្រូសារពាង្គកាយឯក កោសិកា និងមួយចំនួនជាពហុកោសិកាអ៊ីការីយ៉ូត (ប្រូទីសរុក្ខជាតិ)។ រដ្ឋប្រូទីសរួមមាន ប្រូទីសសត្វ ប្រូទីសរុក្ខជាតិ និងប្រូទីសផ្សិត។ ប្រូទីសរុក្ខជាតិបង្កឡើងដោយធាតុកោសិកាក្លរូប្លាស្ទិក និងផ្ទុកពន្លឺ ដែលជាលក្ខណៈខុសពីប្រូទីសសត្វ។

3. សំណួរគន្លឹះ

.....

4. សម្មតិកម្ម

ចូរសាកល្បងគូរទម្រង់រូបរាងប្រូទីសទឹកសាប ។

5. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ



ដំណើរការ

- បន្តក់ទឹកត្រពាំងមួយតំណក់នៅលើបន្ទះឡាម រួចគ្របឡាម៉ែលពីលើតំណក់ទឹក នោះថ្មមៗកុំឱ្យកើតពពុះទឹក។
- យកមកពិនិត្យក្នុងមីក្រូទស្សន៍ ដោយប្រើអុបស៊ុចទីបលេខតូចមុន (4X ឬ 10X)។

6. វិភាគលទ្ធផល

ចូរគូររូបដែលពិនិត្យឃើញតាមមីក្រូទស្សន៍

7. សន្និដ្ឋាន

១.៣.មេរៀនពិសោធន៍

ឥទ្ធិពលអំពៅស៊ីតេពន្លឺលើល្បឿនរស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិ


ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីល្បឿនរស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិអាស្រ័យទៅនឹងអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

រស្មីសំយោគជាដំណើរដែលរុក្ខជាតិបែតង និងសារពាង្គកាយមួយចំនួនទៀត ប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺ ដើម្បីសំយោគសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ខ្លួនវា។ នៅក្នុងកំឡុងពេលរស្មីសំយោគឧស្ម័នកាបូនិច (CO₂) និងទឹក (H₂O) ត្រូវបានបំប្លែងជាគ្រួសកូស (C₆H₁₂O₆) និងឧស្ម័នអុកស៊ីសែន (O₂)។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នាចំហាយទឹក និងឧស្ម័នអុកស៊ីសែន ក៏ត្រូវបានបំបាយចេញទៅក្នុងបរិយាកាសតាមរយៈរន្ធស្តុម៉ាត។ ដំណើររស្មីសំយោគប្រែប្រួលដោយកត្តាមួយចំនួនដូចជា៖ កំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិច បរិមាណទឹក សីតុណ្ហភាព សារធាតុខនិច និងថាមពលពន្លឺ (អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ)។



រូប 1.8 ទំនាក់ទំនងឥទ្ធិពលពន្លឺជាមួយដំណើរការរស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិ

3. ណែនាំដំណើរការពិសោធន៍


ចំពោះចកកន្ទុយវិទ្យុ សូមយករុក្ខជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យពេញលេញ និងជាចកដែលមានទំហំដើមធំ មិនខ្លីពេក និងមិនចាស់ពេក។ ចៀសវាងយករុក្ខជាតិដែលដាំនៅក្នុងផ្ទះ ឬក្រោមម្លប់ ដែលធ្វើឱ្យការធ្វើរស្មីសំយោគមានល្បឿនខ្សោយ។

¹ <https://www.agcled.com/blog/how-led-grow-light-help-the-growth-of-plants.html>.

5. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារៈ ពិលប្រើថ្មប៊ី កូនសារាយប្រចកកន្ទុយផ្លែ កន្ត្រៃ បន្ទាត់ នាឡិកា ដបដីថ្លា (ឬបំពង់កែវថ្លា) ទឹក។

ដំណើរការ ចូររៀបចំនូវដំណើរការពិសោធន៍របស់ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។



សូមប្រើពិលដែលមានថ្មីចំនួន៣កូន (ថ្មីថ្មី) ហើយមានភ្លើងពណ៌ពងមាន់ ដោយចៀសវាងភ្លើងអំពូលពណ៌ស ដែលជះឥទ្ធិពលលើការរំកាយចំហាយ ទឹករបស់ចកកន្ទុយផ្លែ។

សូមប្រើបន្ទាត់ក្រិតដែលមានប្រវែង៥០សង់ ទីម៉ែត្រ។

ក. តារាងលទ្ធផល

ចម្ងាយក្រិត ពីដបដី	ចំនួនពពុះទឹក លើកទី១/១នាទី	ចំនួនពពុះទឹក លើកទី២/១នាទី	ចំនួនពពុះទឹក លើកទី៣/១នាទី	មធ្យមភាគ ពពុះទឹក
40cm				
30cm				
20cm				
10cm				
5cm				

ក្នុងតារាងនេះប្រសិនបើមានពេលគ្រប់គ្រាន់ សូមណែនាំឱ្យសិស្សធ្វើ ពិសោធន៍បាន៤ទៅ៥ដងរាល់ចម្ងាយក្រិតនីមួយៗដើម្បីពួកគេទទួលបាន ទិន្នន័យច្រើន។ សូមបញ្ជាក់ថាកាលណាទិន្នន័យនៃការពិសោធកាន់ច្រើន នោះ ការលម្អៀងនៃការវិភាគកាន់តែតិចដែរ។

ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកអិច្វការពិសោធរបស់គ្រូ



ប្រធានបទ ឥទ្ធិពលអាំងតង់ស៊ីតេតនៃលើល្បឿនរស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិ

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីល្បឿនរស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិអាស្រ័យទៅនឹងអាំងតង់ស៊ីតេតនៃរស្មី។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

រស្មីសំយោគជាដំណើរដែលរុក្ខជាតិបែតង និងសារពាង្គកាយមួយចំនួនទៀត ប្រើប្រាស់ ថាមពលពន្លឺ ដើម្បីសំយោគសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ខ្លួនវា។ នៅក្នុងកំឡុងពេលរស្មីសំយោគឧស្ម័នកាបូនិច (CO_2) និងទឹក (H_2O) ត្រូវបានបំប្លែងជាគ្លុយកូស ($C_6H_{12}O_6$) និងឧស្ម័នអុកស៊ីសែន (O_2)។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នាថាមពលទឹក និងឧស្ម័នអុកស៊ីសែន ក៏ត្រូវបានបំបាយចេញទៅក្នុងបរិយាកាសតាមរយៈរន្ធស្នូម៉ាត។ ដំណើររស្មីសំយោគប្រែប្រួលដោយកត្តាមួយចំនួនដូចជា៖ កំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិច បរិមាណទឹក សីតុណ្ហភាព សារធាតុខនិច និងថាមពលពន្លឺ (អាំងតង់ស៊ីតេតនៃរស្មី)។



រូប 1.9 ទម្រង់ខ្នាតទទឹងស្លឹករុក្ខជាតិ

3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើកត្តាអាំងតង់ស៊ីតេតនៃរស្មីមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើដំណើររស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិ ?

៣.២ សម្មតិកម្ម

ចម្ងាយក្រិតពីដបជ័រ	ចំនួនពពុះទឹកលើកទី1/1នាទី	ចំនួនពពុះទឹកលើកទី2/1នាទី	ចំនួនពពុះទឹកលើកទី3/1នាទី	មធ្យមភាគពពុះទឹក
40cm				
30cm				
20cm				
10cm				
5cm				

៣.៣ ការពិសោធន៍

សម្ភារៈ

ពិលប្រើថ្នាំបី ចកកន្ទុយឆ្មៃ^២ កន្រ្តៃ បន្ទាត់ នាឡិកា ដបជ័រថ្លា (ឬបំពង់កែវថ្លា) ទឹក។



ដំណើរការ

<p>កាត់ចកកន្ទុយឆ្មៃប្រវែង 10-15 cm បន្ទាប់មក ដាក់វានៅក្នុងដបជ័រ ឬបំពង់សាក ដែលមានទឹក ដោយដាក់ផ្នែក គល់រុក្ខជាតិ</p>	<p>ក្រិតចម្ងាយ 5cm 10cm 20cm 30cm និង 40cm ពីដបជ័រថ្លា។</p>
<p>បើកពន្លឺពិលហើយដាក់នៅចម្ងាយ 5cm (ក្រិតទីមួយ)។ រង់ចាំមើលពពុះទឹក ចេញពីគល់ចកកន្ទុយឆ្មៃរយៈពេលប្រហែល ៣០វិនាទី ទើបអាចសង្កេតឃើញពីពពុះ។</p>	<p>រាប់ចំនួនពពុះទឹកចំនួនពីរលើក។ ក្នុងមួយលើកមានរយៈពេលមួយនាទី។ ធ្វើបែបនេះគ្រប់ចម្ងាយដែលបានក្រិត (5cm 10cm 20cm 30cm និង 40cm)។</p>

ចំណាំ៖ រាល់ចម្ងាយនីមួយៗពីដបជ័រថ្លាត្រូវរាប់ចំនួនពពុះទឹកឱ្យបានបីដង ដោយក្នុង ក្នុងនាទីម្តងៗបន្ទាប់មកធ្វើមធ្យមភាគ។

² ចកកន្ទុយឆ្មៃស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ ceratophyllum។

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល

ចំនួនពពុះដែលបានកាយចេញពីដើមចកកន្ទុយផ្លែ បានបង្ហាញថានោះជាលទ្ធផលនៃការធ្វើស្នើសំយោគរបស់រុក្ខជាតិ ហើយឧស្ម័នដែលកាយចេញតាមរយៈពពុះទឹកនោះជាឧស្ម័នអុកស៊ីសែន។ តាមរយៈលទ្ធផលការពិសោធបានបង្ហាញថា ចំនួនពពុះទឹកបានប្រែប្រួលខុសៗគ្នាទៅតាមចម្ងាយរបស់ពន្លឺភ្លើងពិល។ ចំនួនពពុះទឹកដែលបានកត់ត្រាពីចម្ងាយ 5cm មានចំនួនច្រើនជាងគេ បន្ទាប់មក 10cm និងតាមលំដាប់ចម្ងាយជាបន្តបន្ទាប់ (តារាង 1.1)។ លទ្ធផលនេះបានបញ្ជាក់ថាកត្តាអាំងតង់ស៊ីតេរបស់ពន្លឺមានទំនាក់ទំនង និងឥទ្ធិពលទៅលើល្បឿននៃការធ្វើស្នើសំយោគរបស់រុក្ខជាតិ។ កាលណាកត្តាអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺកាន់តែខ្លាំង នោះល្បឿននៃការធ្វើស្នើសំយោគកាន់តែលឿនដែរផ្ទុយមកវិញកាលណាកត្តាអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺកាន់តែខ្សោយនោះល្បឿន នៃការធ្វើស្នើសំយោគកាន់តែយឺតដែរ។


ក. តារាងលទ្ធផល

តារាង 1.1 ៖ លទ្ធផលចំនួនពពុះទឹកទៅតាមចម្ងាយទីតាំងខុសៗគ្នារបស់ពន្លឺ³

ចម្ងាយ ក្រិតពីដប	ចំនួនពពុះទឹក លើកទី១/១នាទី	ចំនួនពពុះទឹក លើកទី២/១នាទី	ចំនួនពពុះទឹក លើកទី៣/១នាទី	ចំនួនពពុះទឹក គិតជាមធ្យម
40cm	32	29	23	28.00
30cm	45	41	54	46.67
20cm	83	38	75	65.33
10cm	101	72	83	85.33
5cm	102	96	91	96.33

ខ. ដ្យាក្រាម

ចូរសង់ដ្យាក្រាមដោយផ្អែកលើលទ្ធផលចំនួនពពុះទឹកធៀបទៅនឹងចម្ងាយដបជំរើមួយៗ នៅក្នុងតារាងខាងលើ។



ក្រាប 1.1 ទំនាក់ទំនងរវាងកត្តាអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ⁴ ទៅនឹងល្បឿនរស្នើសំយោគ⁵

³ ទិន្នន័យនេះបានពីការធ្វើពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី១១ នៃវិទ្យាល័យព្រះសីហនុ ខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី២៤- ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២។

⁴ កត្តាអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺទីនេះគឺជាចម្ងាយក្រិតពីដប។

⁵ ល្បឿនរស្នើសំយោគទីនេះគឺជាចំនួនមធ្យមនៃចំនួនពពុះដែលចេញពីចកកន្ទុយផ្លែ។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

ដូច្នេះពន្លឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ និងមិនអាចខ្វះបានចំពោះរុក្ខជាតិបែតងនៅក្នុងដំណើរការផលិត អាហាររបស់ពួកវាតាមរយៈដំណើរការរស្មីសំយោគ កាលណាអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺកាន់តែខ្លាំងល្បឿនរស្មី សំយោគកាន់តែលឿនដែរ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតតាមរយៈបាតុភូតរស្មីសំយោគនៅលើស្លឹករបស់រុក្ខជាតិបាន ផលិតនូវឧស្ម័នអុកស៊ីសែនយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សសត្វនៅលើភពផែនដីយើងនេះ។

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្និកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ ឥទ្ធិពលអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺលើល្បឿនរស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិ

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីល្បឿនរស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិអាស្រ័យទៅនឹងអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

រស្មីសំយោគដំណើរដែលរុក្ខជាតិបែតង និងសារពាង្គកាយមួយចំនួនទៀត ប្រើប្រាស់ ថាមពលពន្លឺ ដើម្បីសំយោគសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ខ្លួនវា។ នៅក្នុងកំឡុងពេលរស្មីសំយោគឧស្ម័នកាបូ និច (CO₂) និងទឹក (H₂O) ត្រូវបានបំប្លែងជាគ្លុយកូស (C₆H₁₂O₆) និងឧស្ម័នអុកស៊ីសែន (O₂)។ ក្នុង ពេលដំណាលគ្នាចំហាយទឹក និងឧស្ម័នអុកស៊ីសែន ក៏ត្រូវបានបំបាយចេញទៅក្នុងបរិយាកាសតាមរ យៈរន្ធស្នូម៉ាត។ ដំណើរការរស្មីសំយោគប្រែប្រួលដោយកត្តាមួយចំនួនដូចជា៖ កំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិច បរិមាណទឹក សីតុណ្ហភាព សារធាតុខនិច និងថាមពលពន្លឺ (អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ)។

3. សំណួរគន្លឹះ

.....


ចូរធ្វើការព្យាករណ៍មុនការពិសោធអំពីចំនួនពពុះទឹកនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ដោយសរសេរ ពាក្យ “តិច” ឬ “ច្រើន” ឬ “ច្រើនជាងគេ” តាមរយៈចម្ងាយនីមួយៗ។

ចំនួនពពុះទឹក	5cm	10cm	20cm	30cm	40cm
តិច					
ច្រើន					
ច្រើនជាង					

5. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ ពិលប្រើថ្មបី កូនសារាយប្រចកកន្ទុយផ្អែ កន្រ្ត បន្ទាត់ នាឡិកា ដបដីថ្លា (ឬបំពង់កែវថ្លា) ទឹក។

ដំណើរការ ចូររៀបចំនូវដំណើរការពិសោធរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។




6. វិភាគលទ្ធផល

តារាងលទ្ធផល

ចម្ងាយត្រីកពីដបដី	ចំនួនពពុះទឹកលើកទី 1/1 នាទី	ចំនួនពពុះទឹកលើកទី 2/1 នាទី	ចំនួនពពុះទឹកលើកទី 3/1 នាទី	មធ្យមភាគពពុះទឹក
40cm				
30cm				
20cm				
10cm				
5cm				

ដ្យាក្រាម



ការពិភាក្សា

១) ពេលចម្ងាយពន្លឺកាន់តែឆ្ងាយ តើអ្នកសង្កេតឃើញចំនួនពពុះទឹកប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច?
តើការប្រែប្រួលនោះបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វី?

.....

២) តើវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចរវាងល្បឿនរស្មីសំយោគ និងកត្តាអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ?

.....

៣) ហេតុអ្វីបានជារុក្ខជាតិត្រូវការទឹកជាចាំបាច់?

.....

7. សន្និដ្ឋាន

.....

១.៤.មេរៀនពិសោធន៍៤

សង្កេតពីអត្តសញ្ញាណឧស្ម័នកាបូនិចនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមកោសិកា


ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីអត្តសញ្ញាណឧស្ម័នកាបូនិចនៃដង្ហើមកោសិកា។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ដង្ហើមកោសិកា ជាដំណើរការដែលកោសិកាទទួលបានថាមពលពីការបំបែកម៉ូលេគុលគ្រុយកូសនៅក្នុងកោសិកា។ ផលិតផលសំខាន់នៃដង្ហើមកោសិកាគឺ ថាមពល ហើយសំណល់គឺឧស្ម័នកាបូនិច និងទឹក។ នៅក្នុងសារពាង្គកាយម៉ូលេគុលគ្រុយកូសទទួលបាននូវចំហេះជាមួយឧស្ម័នអុកស៊ីសែនផ្តល់ជាថាមពល ហៅថាសមីការដង្ហើម។ សមីការដង្ហើមកោសិកាត្រូវបានសរសេរដូចខាងក្រោម៖



3. ណែនាំដំណើរការពិសោធន៍

សំណួរគន្លឹះមាននៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់គ្រូ

សូមណែនាំឱ្យសិស្សបំពេញសាកល្បងក្នុងតារាងដោយប្រើពាក្យ “ប្រែប្រួល” ឬ “មិនប្រែប្រួល” របស់ដបនីមួយៗ។ សូមចងចាំថានេះជាការព្យាករទុកមុនធ្វើការពិសោធន៍ ដូច្នេះសូមកុំបារម្ភទោះបីជាការបំពេញរបស់ពួកគាត់ខុស ឬត្រូវក៏ដោយ។

1. វត្ថុបំណង
សង្កេតពីអត្តសញ្ញាណឧស្ម័នកាបូនិចនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមកោសិកា។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន
ដង្ហើមកោសិកាជាដំណើរការដែលកោសិកាទទួលបានថាមពលពីការបំបែកម៉ូលេគុលក្លុយកូសនៅក្នុងកោសិកា។ ផលិតផលសំខាន់នៃដង្ហើមកោសិកាគឺ ថាមពល ហើយសំណល់គឺឧស្ម័នកាបូនិច និងទឹក។ នៅក្នុងសារពាង្គកាយម៉ូលេគុលក្លុយកូសទទួលបានថាមពលជាមួយឧស្ម័នអុកស៊ីសែនផ្តល់ជាថាមពល ហៅថាសមីការ ដង្ហើម។

3. សំណួរគន្លឹះ

4. សម្មតិកម្ម
ចូរស្រមៃធ្វើការព្យាករលើមុខការពិសោធន៍ ដោយប្រាប់ខ្លួនឯងថា របស់ទឹកកំបោរនៅក្នុងពាងក្រោមដោយសរសេរពាក្យ “ប្រែប្រួល” ឬ “មិនប្រែប្រួល”

ឈ្មោះ ទឹកកំបោរ	ឈ្មោះ ទឹកកំបោរថ្មី
ឈ្មោះ ១ : ខ្យល់ក្នុងបិយាកាស + ទឹកកំបោរថ្មី	
ឈ្មោះ ២ : ខ្យល់ដង្ហើម + ទឹកកំបោរថ្មី	

5. ដំណើរការពិសោធន៍

ដំណើរការ

ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់គ្រូ


ប្រធានបទ សង្កេតពីអត្តសញ្ញាណឧស្ម័នកាបូនិចនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមកោសិកា

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីអត្តសញ្ញាណឧស្ម័នកាបូនិចនៃដង្ហើមកោសិកា។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ដង្ហើមកោសិកា ជាដំណើរការដែលកោសិកាទទួលបានថាមពលពីការបំបែកម៉ូលេគុលក្លុយកូសនៅក្នុងកោសិកា។ ផលិតផលសំខាន់នៃដង្ហើមកោសិកាគឺ ថាមពល ហើយសំណល់គឺឧស្ម័នកាបូនិច និងទឹក។ នៅក្នុងសារពាង្គកាយម៉ូលេគុលក្លុយកូសទទួលបានថាមពលនូវចំហេះជាមួយឧស្ម័នអុកស៊ីសែនផ្តល់ជាថាមពល ហៅថាសមីការដង្ហើម។ សមីការដង្ហើមកោសិកាត្រូវបានសរសេរដូចខាងក្រោម៖



3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើអត្តសញ្ញាណឧស្ម័នកាបូនិចនៃដង្ហើមកោសិកាត្រូវបានបង្ហាញឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

៣.២ សម្មតិកម្ម

តើទឹកកំបោរថ្មីនៅក្នុងដបទាំងពីរប្រែប្រួលឬទេ?

សូមធ្វើការព្យាករណ៍មុនការពិសោធដោយប្រាប់នូវលក្ខណៈរបស់ទឹកកំបោរថ្លាក្នុងដបទាំងពីរនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

លក្ខណៈទឹកកំបោរ	លក្ខណៈទឹកកំបោរថ្លា	
ដបទី១៖ ខ្យល់ក្នុងបរិយាកាស + ទឹកកំបោរថ្លា
ដបទី២៖ ខ្យល់ដង្ហើម + ទឹកកំបោរថ្លា

៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារៈ ទឹកកំបោរថ្លា ដបទឹកសុទ្ធ ថង់ច្រកខ្យល់បរិយាកាស។



ដំណើរការ

ទី១

រៀបចំដបដីថ្លាចំនួនពីរ ថង់ច្រកខ្យល់ និងទឹកកំបោរថ្លា

ទី២

បញ្ចូលទឹកកំបោរថ្លាចំនួន ១០មីលីត្រទៅក្នុងដបទាំងពីរ


ទី៣

- ច្របាច់ខ្យល់បរិយាកាសក្នុងថង់ចូលក្នុងដបទី១ ។
- បន្ទាប់មកផ្តុំខ្យល់ដង្ហើមចូលក្នុងដបទី២ ។

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល

លក្ខណៈទឹកកំបោរ	លក្ខណៈទឹកកំបោរថ្លា	
ដបទី១៖ ខ្យល់ក្នុងបរិយាកាស + ទឹកកំបោរថ្លា	មិនប្រែប្រួល	ថ្លា
ដបទី២៖ ខ្យល់ដង្ហើម + ទឹកកំបោរថ្លា	ប្រែប្រួល	ល្អក់

ផ្អែកតាមលទ្ធផលពិសោធបង្ហាញថាទឹកកំបោរថ្លា $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ក្នុងដបទី១មិនបានប្រែប្រួល ទេពីព្រោះទឹកកំបោរថ្លា មិនបានរងប្រតិកម្មគីមីជាមួយឧស្ម័នកាបូនិច (CO_2)។ លទ្ធផលមិនប្រែប្រួល នេះដោយសារនៅក្នុងដបច្រកខ្យល់បរិយាកាសក្បត់ឧស្ម័នកាបូនិច។ ចំណែកទឹកកំបោរថ្លានៅក្នុងដប ទី២ប្រែជាល្អក់បន្ទាប់ពីបានផ្គុំខ្យល់ដង្ហើមចូលទៅក្នុងដប។ ការប្រែប្រួលលក្ខណៈទឹកកំបោរនៅក្នុងដប ពីថ្លាទៅជាល្អក់របស់ដបទី២គឺបណ្តាលមកពីវត្តមានរបស់ឧស្ម័នកាបូនិចដែលមាននៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើម ចេញ។ ទឹកកំបោរថ្លា $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ទទួលរងប្រតិកម្មគីមីជាមួយឧស្ម័នកាបូនិច (CO_2) បណ្តាលឱ្យទឹក កំបោរថ្លាប្រែជាល្អក់។ ព្រឹត្តិការណ៍នៃខ្យល់ដង្ហើមចេញប៉ះជាមួយទឹកកំបោរថ្លាត្រូវបានបង្ហាញឡើងដូច សមីការគីមីខាងក្រោម៖



៣.៥ សន្និដ្ឋាន

យោងតាមលទ្ធផលនៃការពិសោធនេះបានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងដង្ហើមកោសិកាមានការបញ្ចេញ ឧស្ម័នកាបូនិចតាមរយៈខ្យល់ដង្ហើមចេញ។ ហេតុដូច្នេះសម្មតិកម្មខាងលើត្រូវបានគាំទ្រដោយលទ្ធផល ពិសោធន៍នេះ។

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្និកម្មការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ សង្កេតពីអត្តសញ្ញាណឧស្ម័នកាបូនិចនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមកោសិកា

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីអត្តសញ្ញាណឧស្ម័នកាបូនិចនៃដង្ហើមកោសិកា។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ដង្ហើមកោសិកា ជាដំណើរការដែលកោសិកាទទួលបានថាមពលពីការបំបែកម៉ូលេគុលគ្លុយកូសនៅ ក្នុងកោសិកា។ ផលិតផលសំខាន់នៃដង្ហើមកោសិកាគឺ ថាមពល ហើយសំណល់គឺឧស្ម័នកាបូនិច និងទឹក។ នៅក្នុងសារពាង្គកាយម៉ូលេគុលគ្លុយកូសទទួលរងនូវចំហេះជាមួយឧស្ម័នអុកស៊ីសែនផ្តល់ជា ថាមពល ហៅថាសមីការដង្ហើម។

3. សំណួរគន្លឹះ

.....

4. សម្មតិកម្ម

ចូរសូមធ្វើការព្យាករណ៍មុនការពិសោធដោយប្រាប់នូវលក្ខណៈរបស់ទឹកកំបោរថ្លានៅក្នុង តារាងខាងក្រោមដោយសរសេរពាក្យ “ប្រែប្រួល” ឬ “មិនប្រែប្រួល”

លក្ខណៈទឹកកំបោរ	លក្ខណៈទឹកកំបោរថ្លា
ដបទី១៖ ខ្យល់ក្នុងបរិយាកាស + ទឹកកំបោរថ្លា
ដបទី២៖ ខ្យល់ដង្ហើម + ទឹកកំបោរថ្លា

5. ដំណើរការពិសោធសម្ភារ



ដំណើរការ

<p>ទី១</p> <p>រៀបចំដបជ័រថ្លាចំនួនពីរ ថង់ច្រកខ្យល់ និងទឹកកំបោរថ្លា</p>	<p>ទី២</p> <p>បញ្ចូលទឹកកំបោរថ្លាចំនួន ១០មីលីត្រ ទៅក្នុងដបទាំងពីរ</p>	<p>ទី៣</p> <ul style="list-style-type: none"> • ប្រាប់ខ្យល់បរិយាកាសក្នុងថង់ច្រកក្នុងដបទី១ ។ • បន្ទាប់មកផ្តុំខ្យល់ដង្ហើមចូលក្នុងដបទី២ ។
--	---	---

6. វិភាគលទ្ធផល

លក្ខណៈទឹកកំបោរ	លក្ខណៈទឹកកំបោរថ្លា	
ដបទី១៖ ខ្យល់ក្នុងបរិយាកាស + ទឹកកំបោរថ្លា
ដបទី២៖ ខ្យល់ដង្ហើម + ទឹកកំបោរថ្លា

.....

.....

7. សន្និដ្ឋាន

.....

.....

១.៥.មេរៀនពិសោធន៍៥

ឥទ្ធិពលស្ករលើសកម្មភាពដំបែ

ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីឥទ្ធិពលស្ករលើសកម្មភាពដំបែ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ផ្សិតដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបំបែក និងបង្កើតវដ្តរូបធាតុនៅលើផែនដី។ អ្នកផលិតនំប៉័ង ថែមដំបែទៅក្នុងម្សៅទន់ដើម្បីឱ្យម្សៅឡើងមេ។ កោសិកាដំបែប្រើប្រាស់ស្ករ ដើម្បីលូតលាស់ ហើយវាផលិតឧស្ម័នកាបូនិច (CO₂)។ ឧស្ម័នកាបូនិចនេះបង្កើតជាពពុះខ្យល់ដែលបណ្តាលឱ្យម្សៅទន់ៗនោះឡើងប៉ោង។ យើងសង្កេតឃើញពពុះខ្យល់ទាំងនោះដូចជារន្ធ ឬប្រហោងជាច្រើននៅពេញក្នុងសាច់នំប៉័ង។

3. ណែនាំដំណើរការពិសោធន៍

បម្រុងប្រយ័ត្ន
 ចំពោះការថ្លឹងស្ករ និងដំបែ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពេលប្រើជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិច (ជញ្ជីងដែលសុក្រិតសម្រាប់ការថ្លឹងមានតម្លៃឯកតា 0.0g)។ ករណីគ្មានជញ្ជីង យើងអាចប្រើស្លាបព្រាបាយសម្រាប់កំណត់បរិមាណស្ករ និងដំបែ។ ដំបែត្រូវកិន ឬបូកឱ្យម៉ត់មុនពេលថ្លឹង ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតលម្អៀង។



លោកគ្រូ អ្នកគ្រូអាចប្រើមេដំបែ ឬម៉េរ៉ាសូដា (Baking Soda)

- ប្រុងប្រយ័ត្ន៖
- ដើម្បីឱ្យប្រតិកម្មដំណើរការល្អ សូមប្រើទឹកក្តៅ ៣៥ °C ទៅ ៣៨ °C សម្គាល់ដោយទឹកក្តៅ ៣៥ °C អាចបន្តក់លើខ្នងដៃក្នុងមិនរលាក “ករណីក្តៅពេកនឹងធ្វើឱ្យផ្សិតងាប់”។ * សូមប្រុងប្រយ័ត្នដោយទុកដាក់ដបដែលបានលាយមេដំបែរួចនៅក្នុងទូរ ឬកន្លែងដែលបិទជិត។
 - សូមយកចិត្តទុកដាក់ កត្តាសីតុណ្ហភាព និងពន្លឺសុទ្ធតែជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រតិកម្ម ដែលធ្វើឱ្យប្រែប្រួលដល់លទ្ធផលពិសោធន៍។

ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់គ្រូ

ប្រធានបទ ឥទ្ធិពលស្ករលើសកម្មភាពដំបែ

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីឥទ្ធិពលស្ករលើសកម្មភាពដំបែ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ផ្សិតដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបំបែក និងបង្កើតវដ្តរូបធាតុនៅលើផែនដី។ អ្នកផលិតនំប៉័ង ប្រើដំបែដែលជាប្រភេទផ្សិតម្យ៉ាង ដែលលាយជាមួយម្សៅសម្រាប់ឡើងមេដោយវាផលិតបានឧស្ម័នកាបូនិច (CO₂) ហើយឧស្ម័ននេះបង្កើតជាពុះខ្យល់ ដែលបណ្តាលឱ្យម្សៅឡើងទន់រីកប៉ោងដែលយើងសង្កេតឃើញពុះខ្យល់ទាំងនោះដូចជារន្ធ ឬប្រហោងជាច្រើននៅពាសពេញក្នុងសាច់នំប៉័ង។

3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើស្ករមានឥទ្ធិពលទៅលើសកម្មភាពដំបែដូចម្តេច ?

៣.២ សម្មតិកម្ម

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលយើងដាក់សារធាតុដូចក្នុងតារាងចូលទៅក្នុងដបនីមួយៗ ?

គូសសញ្ញា ✓ នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖



ក ដំបែស្ករ ៥០g ខ ដំបែ ៥០g + ស្ករ ២៥g គ ដំបែ ៥០g + ស្ករ ៥០g ឃ ស្ករស្ករ ៥០g

រូប 1.10 ការព្យាករណ៍នៅមុនពេលពិសោធន៍

សារធាតុក្នុងដប		លក្ខណៈរបស់ប៉ោងប៉ោងលើដបនីមួយៗ			
		ស្ងួត	ប៉ោងតិចៗ	ប៉ោងមធ្យម	ប៉ោងខ្លាំង
ដប “ក”	ដំបែស្ករ ៥០g				
ដប “ខ”	ដំបែ ៥០g + ស្ករ ២៥g				
ដប “គ”	ដំបែ ៥០g + ស្ករ ៥០g				
ដប “ឃ”	ស្ករស្ករ ៥០g				

៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ ដបដីរ (ដបទឹកស្ករ) ចំនួន ៤ ប៉ោងប៉ោង ៤ ចង្កឹះ ៤ ដើម ស្ករ ដំបែ ឬមេនំប៉័ង (Baking Soda) ទឹកក្តៅ ២ ឈ្នួល ដង្ហើម អេឡិចត្រូនិក កែវក្រិត ឆ្នាំងសម្រាប់ដាំទឹក និងចង្ក្រានហ្គាស់។



រូប 1.11 សម្ភារពិសោធន៍

ដំណើរការ

- រៀបចំដបចំនួន៤រៀងគ្នា “ក” “ខ” “គ” “ឃ”
- ដាក់ស្ករក្នុងដប “ខ” ចំនួន25g ហើយដប “គ” និង“ឃ” ចំនួន50g ដូចគ្នា
- ដាក់ដំបែចំនួន50g ក្នុងដប “ក” “ខ” និង “គ”
- ចាក់ទឹកក្តៅ១ល្អាង (35 0C ទៅ 38 0C)ចូលទៅក្នុងដបទាំង៤ក្នុងចំណុះស្មើៗគ្នា 250ml
- បន្ទាប់មកយកចម្អិនកូរឱ្យសព្វរួចដាក់ប៉ោងប៉ោងគ្របលើមាត់ដបនោះឱ្យបានជិត និងតឹងណែនល្អ
- បន្ទាប់មកយកដបទាំង៤ទៅដាក់នៅក្នុងទូរ ឬធុងបិទជិត
- សង្កេតការប៉ោងឡើងនៃប៉ោងៗរាល់រយៈពេល ៥ម៉ោង ម្តង រួចកត់ត្រាដាក់ចូលក្នុងតារាងលទ្ធផល។

➢ រក្សាទុកដបទាំង៤នោះរយៈពេល ២៤ម៉ោង ដើម្បីឱ្យឃើញលក្ខណៈខុសគ្នាកាន់តែខ្លាំង។

ចំណាំ៖ ចំពោះប៉ោងប៉ោង មុនយកទៅដាក់លើមាត់ដបត្រូវទាញឱ្យមានភាពយឺតសិន។

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល



ក ដំបែស្ករ៥០g ខ ដំបែ50g+ស្ករ25g គ ដំបែ50g +ស្ករ150g ឃ ស្ករស្ករ៥០g

រូប 1.12 លទ្ធផលក្រោយរក្សាទុករយៈពេលរក្សាទុក ២៤ម៉ោង

តារាង 1.2 លទ្ធផលពិសោធបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ប៉ោងប៉ោងនៅលើដបនីមួយៗ។

សារធាតុក្នុងដប		លក្ខណៈរបស់ប៉ោងប៉ោងលើដបនីមួយៗ			
		ស្វិត	ប៉ោងតិចៗ	ប៉ោងមធ្យម	ប៉ោងខ្លាំង
ដប“ក”	ដំបែស្ករ៥០g				
ដប “ខ”	ដំបែ50g + ស្ករ25g				
ដប “គ”	ដំបែ50g +ស្ករ150g				
ដប “ឃ”	ស្ករស្ករ៥០g				

លទ្ធផលពិសោធក្រោយពីរក្សាទុករយៈពេល២៤ម៉ោង បានបង្ហាញថាប៉ោងប៉ោងនៅលើដប “ក” “ខ” និងដប “គ” មានទំហំខុសៗគ្នាគឺ ដប“ក” ប៉ោងប៉ោងតូចជាងគេ បន្ទាប់មកដប“ខ” និងដប“គ” ប៉ោងប៉ោងធំៗជាងគេ។ ចំណែកប៉ោងប៉ោងដប “ឃ” មានសភាពស្ងួត។ លទ្ធផលនេះបញ្ជាក់ថាដំបែនៅក្នុងដបទាំងបី (“ក” “ខ” និង“គ”) ដែលមានបរិមាណស្ករខុសៗគ្នាមានសកម្មភាពខុសគ្នាដែរ។ ដូចនេះសម្មតិកម្មដែលបានលើកឡើងថាស្ករមានឥទ្ធិពលអាស្រ័យលើបរិមាណខុសៗគ្នា និងការព្យាករណ៍ក្នុងតារាងខាងលើត្រូវត្រូវបានគាំទ្រដោយលទ្ធផលពិសោធនេះ។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

តាមរយៈលទ្ធផលខាងលើ យើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាស្ករពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើសកម្មភាពដំបែពិតប្រាកដមែន។

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ ឥទ្ធិពលរបស់ស្ករលើសកម្មភាពដំបែ

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីឥទ្ធិពលស្ករលើសកម្មភាពដំបែ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ផ្សិតដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបំបែក និងបង្កើតវដ្តរូបធាតុនៅលើផែនដី។ អ្នកផលិតនំប៉័ងប្រើដំបែដែលជាប្រភេទផ្សិតម្យ៉ាង ដែលលាយជាមួយម្សៅសម្រាប់ឡើងមេដោយវាផលិតបានឧស្ម័នកាបូនិច (CO₂) ហើយឧស្ម័ននេះបង្កើតជាពពុះខ្យល់ ដែលបណ្តាលឱ្យម្សៅឡើងទន់រីកប៉ោងដែលយើងសង្កេតឃើញពពុះខ្យល់ទាំងនោះដូចជារន្ធ ឬប្រហោងជាច្រើននៅពេលពេញក្នុងសាច់នំប៉័ង។

3. សំណួរគន្លឹះ

.....

4. សម្មតិកម្ម

ចូរធ្វើការព្យាករណ៍នៅក្នុងតារាងខាងក្រោមអំពីលក្ខណៈរបស់ប៉ោងប៉ោងនៅលើមាត់ដបនីមួយៗ ដោយប្រើសញ្ញា ✓

សារធាតុក្នុងដប		លក្ខណៈរបស់ប៉ោងប៉ោងលើដបនីមួយៗ			
		ស្ងួត	ប៉ោងតិចៗ	ប៉ោងមធ្យម	ប៉ោងខ្លាំង
ដប “ក”	ដំបែសុទ្ធសុទ្ធ 50g				
ដប “ខ”	ដំបែ 50g + ស្ករ 25g				
ដប “គ”	ដំបែ 50g + ស្ករ 50g				
ដប “ឃ”	ស្ករ 50g				

សម្ភារៈ ដបជ័រ (ដបទឹកសុទ្ធ) ចំនួន៤ ប៉ោងប៉ោង៤ ចង្កឹះ៤ដើម ស្ករ ដំបែ ឬមេនំប៉័ង (Baking Soda) ទឹកក្តៅ២ណ្តា (35°C ទៅ 38°C) ជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិក កែវក្រិត ឆ្នាំងសម្រាប់ដាំទឹក និងចង្រ្កានហ្គាស់។



ដំណើរការ

- រៀបចំដបចំនួន៤រៀងគ្នា “ក” “ខ” “គ” “ឃ”។
 - ដាក់ស្ករក្នុងដប “ខ” ចំនួន25g ហើយដប “គ” និង “ឃ” ចំនួន50g ដូចគ្នា។
 - ដាក់ដំបែចំនួន50g ក្នុងដប “ក” “ខ” និង “គ”។
 - ចាក់ទឹកក្តៅ២០០ml (35 °C ទៅ 38 °C) ចូលទៅក្នុងដបទាំង៤ក្នុងចំណុះស្មើៗគ្នា250ml។
 - បន្ទាប់មកយកចង្កឹះកូរឱ្យសព្វរួចដាក់ប៉ោងប៉ោងគ្របលើមាត់ដបនោះឱ្យបានជិត និងតឹងណែនល្អ។
 - បន្ទាប់មកយកដបទាំង៤ទៅដាក់នៅក្នុងទូរ ឬធុងបិទជិត ។
 - សង្កេតការប៉ោងឡើងនៃប៉ោងៗរាល់រយៈពេល៥ម៉ោងម្តង រួចកត់ត្រាដាក់ចូលក្នុងតារាងលទ្ធផល។
- រក្សាទុកដបទាំង៤នោះរយៈពេល២៤ម៉ោងដើម្បីឱ្យឃើញលក្ខណៈខុសគ្នាកាន់តែខ្លាំង។

ចំណាំ៖ ចំពោះប៉ោងប៉ោង មុនយកទៅដាក់លើមាត់ដបត្រូវទាញឱ្យមានភាពយឺតសិន។

6. វិភាគលទ្ធផល

សារធាតុក្នុងដប		លក្ខណៈរបស់ប៉ោងប៉ោងលើដបនីមួយៗ			
		ស្វិត	ប៉ោងតិចៗ	ប៉ោងមធ្យម	ប៉ោងខ្លាំង
ដប “ក”	ដំបែសុទ្ធ50g				
ដប “ខ”	ដំបែ50g+ស្ករ125g				
ដប “គ”	ដំបែ50g +ស្ករ150g				
ដប “ឃ”	ស្ករសុទ្ធ50g				

7. សន្និដ្ឋាន

សំណួរត្រិះរិះ

១) ហេតុអ្វីបានជាប៉ោងប៉ោងនៅលើដប ក ដែលមានតែដំបែសុទ្ធប៉ោងប៉ោងឡើងប៉ោងតិចៗ?

.....

២) ហេតុអ្វីបានជាត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅ២០០mlដែលមានសីតុណ្ហភាពសមស្រប (35 °C ទៅ 38 °C) ?

.....

ជំពូក្រ ២ ៖ មេរៀនពិសោធន៍ថ្នាក់ទី១១

២.១.មេរៀនពិសោធន៍ទី១

សង្កេតបេះដូងចំនិកសត្វ

ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីទម្រង់បេះដូងចំនិកសត្វ (បេះដូងជ្រូក) ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន


ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមគឺជាសរីរាង្គបញ្ជូនឈាមទៅកោសិកាគ្រប់ផ្នែកនៃសារពាង្គកាយ។ គ្រប់សត្វទាំងអស់ (លើកលែងតែសត្វឥតឆ្អឹងកងថ្នាក់ទាបមួយចំនួន) សុទ្ធតែមានប្រដាប់ ឬប្រព័ន្ធរបត់ឈាម។ ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមចំនិកសត្វរួមមាន៖ បេះដូង សរសៃឈាមអាទិភាគ អាទិភាគ វ៉ែនការ វ៉ែនស្លូត និងសរសៃប្តូរឈាម។ ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមរបស់ចំនិកសត្វ មាននាទីដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹម និងអុកស៊ីសែនទៅកាន់គ្រប់កោសិកា និងកាកសំណល់មេតាបូលីសមានដូចជាឧស្ម័នកាបូនិច ទឹក និងសារធាតុផ្សេងៗទៀតចេញពីកោសិកាវិញ។ ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមក៏មាននាទីក្នុងការរក្សាចំលើនឹង និងដឹកនាំអង់ទីករសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗ។

3. ណែនាំដំណើរការពិសោធន៍


សូមផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់រូបខាងលើនៅក្នុងដំណាកាលសម្មតិកម្ម ដូចនេះកាប់ពេញឈ្មោះផ្នែកផ្សេងៗរបស់សិស្សអាចត្រូវ ឬអាចខុស។ រូបខាងក្រោមនៅក្នុងដំណាក់កាលវិភាគលទ្ធផលដូចនេះជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ។

បម្រុងប្រយ័ត្ន
មុនពេលដំណើរការវះកាត់បេះដូងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសម្ភារមុតស្រួច ហើយត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់គ្រូឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់

៤. សម្មតិកម្ម
ពួកសត្វខ្លះដូចជាសត្វល្អិតខ្លះ គ្រប់ប្រភេទសត្វល្អិតសត្វល្អិត និងសត្វល្អិត



៥. វិភាគលទ្ធផល
ចូរបំពេញឈ្មោះផ្នែកផ្សេងៗនៃបេះដូងខាងក្រោម។



៦. ដំណើរការពិសោធន៍

- សរសៃផ្អែករាងមុខ និងពងក្រាមរបស់បេះដូង ត្រូវប្រុង និងដាក់បង្កប់នូវសរសៃ និងពងក្រាម។
- កាត់ក្នុងទិសបេះដូង (កាត់បេះដូងពីផ្នែកខាងស្តាំ) ។
- សរសៃប្តូរឈាម សរសៃឈាមអាទិភាគ និងបេះដូង ត្រូវដាក់បង្កប់នូវសរសៃឈាមចិញ្ចឹម។
- សរសៃឈាមសរសៃឈាមចិញ្ចឹម គឺជាសរសៃលើប្តូរ៖
 - សរសៃឈាមចេញពីបេះដូងទៅសរសៃឈាម
 - សរសៃឈាមចិញ្ចឹមសរសៃឈាមបេះដូង
 - សរសៃឈាមចេញពីបេះដូងទៅស្លូត
 - សរសៃឈាមចិញ្ចឹមសរសៃឈាមបេះដូង
- ជំងឺក្បាលរបស់បេះដូងប្រភេទ ក្រុមសរសៃចំនិកសត្វខាងស្តាំ និងផ្នែកខាងស្តាំ។
- សរសៃប្តូរឈាម ឬសរសៃបេះដូង។
- ច្បាប់ទម្រង់ប្រព័ន្ធរបត់ឈាម ក្រុមសរសៃឈាម ឬសរសៃចិញ្ចឹម (ឧទាហរណ៍ និងចម្បងប្រភេទ ចំណី និងប្រភេទសរសៃឈាម និងសរសៃ ចិញ្ចឹម និងសរសៃ) ។

ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកអិច្វការពិសោធរបស់គ្រូ

ប្រធានបទ សង្កេតបេះដូងថ្នាក់សត្វ (បេះដូងជ្រូក)

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីទម្រង់បេះដូងថ្នាក់សត្វ (បេះដូងជ្រូក) ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមគឺជាសរីរាង្គបញ្ជូនឈាមទៅកោសិកា គ្រប់ផ្នែកនៃសារពាង្គកាយ។ គ្រប់សត្វទាំងអស់ (លើកលែងតែ សត្វឥតឆ្អឹងកងថ្នាក់ទាបមួយចំនួន) សុទ្ធតែមានប្រដាប់ ឬប្រព័ន្ធរបត់ឈាម។ ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមថ្នាក់សត្វរួមមាន៖ បេះដូង សរសៃឈាមអាទិអាអក អាទិសួត វ៉ែនការវ វ៉ែនសួត និងសរសៃ ប្តូរឈាម។ ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមរបស់ថ្នាក់សត្វ មាននាទីដឹកនាំសារ ធាតុចិញ្ចឹម និងអុកស៊ីសែនទៅកាន់គ្រប់កោសិកា និងកាក សំណល់មេតាបូលីសមានដូចជាឧស្ម័នកាបូនិច ទឹក និងសារធាតុ ផ្សេងៗទៀតចេញពីកោសិកាវិញ។ ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមក៏មាននាទី ក្នុងការរក្សាថេរលំនឹង និងដឹកនាំអង់ទីករសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ ផ្សេងៗ។



រូប 2.1 ទម្រង់បេះដូងជ្រូកផ្នែក ខាងក្រៅ


3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើបេះដូងថ្នាក់សត្វមានទម្រង់ដូចម្តេច ?

៣.២ សម្មតិកម្ម

ចូរបំពេញផ្នែកផ្សេងៗនៃសរីរាង្គបេះដូងនៅលើរូបខាងក្រោមនេះ។



រូប 2.2 សំណាក់បេះដូងសម្រាប់ការព្យាករណ៍


៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

បេះដូងជ្រូកទាំងមូល កូនកាំបិត កូនកន្ត្រៃ ដង្ហៀប ថាសវះកាត់ ស្រោមដៃ ជ្រូញ ចង្កី កន្សែង ដូតដៃ ស្កុតក្រដាស និងហ្វឺតតូច។

ដំណើរការ

- សង្កត់ផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយរបស់បេះដូង រួចគ្នារួប និងដាក់ឈ្មោះផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ។
- កាត់ខ្នាតទទឹងនៃបេះដូង (កាត់1/3នៃបេះដូងពីផ្នែកចុងស្អិត)។
- សង្កត់លក្ខណៈសរសៃឈាមនៅនឹងបេះដូង រួចសិក្សាចង្កឹះចូលតាមសរសៃឈាមនីមួយៗ។
- សរសេរឈ្មោះសរសៃឈាមនីមួយៗ ដាក់សម្គាល់លើចង្កឹះ
- សរសៃនាំឈាមចេញពីបេះដូងទៅសារពាង្គកាយ។
- សរសៃនាំឈាមពីសារពាង្គកាយចូលបេះដូង
- សរសៃនាំឈាមចេញពីបេះដូងទៅសួត
- សរសៃនាំឈាមពីសួតចូលបេះដូង។
- ពិនិត្យមើលសាច់ដុំសន្ទះខណ្ឌ កម្រាស់សាច់ដុំផ្នែកខាងក្រោមធ្មេង និងផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ។
- សង្កត់លក្ខណៈប្រឹសបេះដូង។
- គូររូបទម្រង់ក្នុងនៃបេះដូងព្រមទាំងដាក់ឈ្មោះ លើផ្នែកនីមួយៗ(ឧទាហរណ៍: ថតលើ និងថតក្រោមធ្មេង ថតលើ និងថតក្រោមស្តាំ អាកទែសួត និងអាអក វ៉ែនការ វ៉ែនសួត)។



រូប 2.3 ទម្រង់ផ្នែកខាងក្នុងនៃបេះដូងជ្រូក

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល

បេះដូងចែកជាបួនថតគឺ: ថតលើធ្មេង ថតក្រោមធ្មេង ថតលើស្តាំ ថតក្រោមស្តាំ ។

សរសៃឈាមរួមមាន: សរសៃប្តូរសួត សរសៃប្តូរកោសិ អាកទែ និងវ៉ែន។

ប្រឹសបេះដូង: ប្រឹសដែលស្ថិតនៅចន្លោះថតលើ និងថតក្រោមទាំងពីរនៃបេះដូង។ និងប្រឹសដែលស្ថិតនៅគល់អាកទែ និងគល់វ៉ែន។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

ដូច្នេះ បេះដូងថតិកសត្វមានបួនថតខណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នា ថតលើ និងថតក្រោមខណ្ឌដោយប្រឹសបេះដូង ថតធ្មេង និងថតស្តាំខណ្ឌដោយសន្ទះសាច់ដុំបិទជិត ហើយមានសរសៃធំៗចំនួនបួនគឺ សរសៃឈាមអាកទែអាអក និងអាទែសួត សរសៃឈាមវ៉ែនការ វ៉ែនសួត។

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្និកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ សង្កត់បេះដូងថតិកសត្វ (បេះដូងជ្រូក)

1. វត្ថុបំណង

សង្កត់ពីទម្រង់ខាងក្រៅ និងទម្រង់ខាងក្នុងនៃបេះដូងថតិកសត្វ (បេះដូងជ្រូក)។


2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមគឺជាសរីរាង្គបញ្ជូនឈាមទៅកោសិកាគ្រប់ផ្នែកនៃសារពាង្គកាយ។ គ្រប់សត្វទាំងអស់ (លើកលែងតែសត្វឥតឆ្អឹងកងថ្នាក់ទាបមួយចំនួន) សុទ្ធតែមានប្រដាប់ ឬប្រព័ន្ធរបត់ឈាម។ ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមចំនិកសត្វរួមមាន៖ បេះដូង សរសៃឈាមអាទៃអាអក អាទៃស្លូត វ៉ែនការ វ៉ែនស្លូត និងសរសៃប្តូរឈាម។ ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមរបស់ចំនិកសត្វ មាននាទីដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹម និងអុកស៊ីសែនទៅកាន់គ្រប់កោសិកា និងកាកសំណល់មេតាបូលីសមានដូចជាឧស្ម័នកាបូនិច ទឹក និងសារធាតុផ្សេងៗទៀតចេញពីកោសិកាវិញ។ ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមក៏មាននាទីក្នុងការរក្សាចលនា និងដឹកនាំអង់ទីកាសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗ។

3. សំណួរគន្លឹះ

.....

ចូរសាកល្បងបំពេញឈ្មោះលើផ្នែកផ្សេងៗលើរូបខាងក្រោមនៅមុនពេលធ្វើពិសោធន៍។



5. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារៈ បេះដូងជ្រូកទាំងមូល កូនកាំបិត កូនកន្ត្រៃ ដង្កៀប ថាសវះកាត់ ស្រោមដៃ ជ្រុញ ចង្កឹះ កន្សែងជូតដៃ ស្កុតក្រដាស និងហ្វឺតតូច។


ដំណើរការ

- សង្កេតផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយរបស់បេះដូង រួចគូររូប និងដាក់ឈ្មោះផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ។
- កាត់ខ្នាតទទឹងនៃបេះដូង (កាត់ 1/3 នៃបេះដូងពីផ្នែកចុងស្តួច)។
- សង្កេតលក្ខណៈសរសៃឈាមនៅនឹងបេះដូង រួចសិក្សាចង្កឹះចូលតាមសរសៃឈាមនីមួយៗ។
- សរសេរឈ្មោះសរសៃឈាមនីមួយៗ ដាក់សម្គាល់លើចង្កឹះ។
 - សរសៃនាំឈាមចេញពីបេះដូងទៅសារពាង្គកាយ។
 - សរសៃនាំឈាមពីសារពាង្គកាយចូលបេះដូង។
 - សរសៃនាំឈាមចេញពីបេះដូងទៅស្លូត។
 - សរសៃនាំឈាមពីស្លូតចូលបេះដូង។
- ពិនិត្យមើលសាច់ដុំសន្ទះខណ្ឌ កម្រាស់សាច់ដុំផ្នែកខាងក្រោមឆ្វេង និងផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ។

- សង្កេតលក្ខណៈប្រើសបេះដូង។
- គូររូបទម្រង់ក្នុងនៃបេះដូង ព្រមទាំងដាក់ឈ្មោះ លើផ្នែកនីមួយៗ (ឧទាហរណ៍: ថតលើ និង ថតក្រោមឆ្វេង ថតលើ និងថតក្រោមស្តាំ អាតទែស្តូត និងអាអក វ៉ែនការវ៉ែន និងវ៉ែនស្តូត)។

6. វិភាគលទ្ធផល

ចូរបំពេញឈ្មោះផ្នែកផ្សេងៗនៃបេះដូងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។



7. សន្និដ្ឋាន

ចូរធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការពិសោធរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

២.២.មេរៀនពិសោធន៍២

វិធីបង្កើនល្បឿនរំលាយអាហារ


ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីដំណើរការរំលាយអាហារ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ការរំលាយអាហារ ជាលំនាំនៃការបំបែកម៉ូលេគុលអាហារធំៗឱ្យទៅជាម៉ូលេគុលតូចៗ ដែលកោសិកាងាយស្រួលបាន។ ដំណើរការរំលាយអាហារកើតឡើងចាប់ពីក្នុងមាត់រហូតដល់អាហារត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកោសិកាក្រោមទម្រង់ជាម៉ូលេគុលអាហារ ដើម្បីផ្តល់ជាថាមពលសម្រាប់សារពាង្គកាយទាំងមូល។ អាហារត្រូវបានរងនូវការបំបែកទៅជាដុំអាហារតូចៗនៅក្នុងបំពង់រំលាយអាហាររួមមាន មាត់ ដើមក បំពង់អាហារ ក្រពះ ពោះវៀនតូច ពោះវៀនធំ និងទ្វារ



រូប 2.4 ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមនុស្ស

ធំដែលជាលំនាំនៃការបំបែកអាហារបែបមេកានិក (រូប 2.4)⁶។ ក្នុងពេលដំណាល គ្នាដុំអាហារតូចៗក៏ត្រូវបានរងនូវការរំលាយទៅជាម៉ូលេគុលអាហារដោយក្រពេញរំលាយអាហាររួមមាន ក្រពេញទឹកមាត់ ថ្លើម លំពែង និងក្រពេញពោះវៀនតូច ដែលជាលំនាំរំលាយអាហារបែបគីមី។ សម្របម៉ូលេគុលអាហារឬសារធាតុចិញ្ចឹមជាលំនាំដែលកើតឡើងភាគច្រើននៅក្នុងពោះវៀនតូចតាមរយៈជ្រាំងពោះវៀន និងតិចតួចនៅក្នុងពោះវៀនធំ។ ម៉ូលេគុលអាហារទាំងនោះត្រូវបានស្រូបទៅក្នុងសរសៃឈាមរួចបញ្ជូនទៅគ្រប់កោសិកានៃសារពាង្គកាយ។

រូប 2.5 ផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រដាប់រំលាយអាហារ និងទំនាក់ទំនងនៃការបរិភោគអាហារ

3. ណែនាំដំណើរការពិសោធន៍

- ណែនាំសិស្សអំពី ការលាយសូលុយស្យុងថ្នាំ Pantyras-K ឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងការរក្សាទុកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងការមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យ។
- ត្រូវយក Pantyras-K មួយគ្រាប់ដាក់ចូលក្នុងកែវដែលមានចំណុះទឹក ១០ml រួចកូរឱ្យរលាយអស់។

4. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារៈ បាយស ថ្នាំ Pantyras-K (អង់ស៊ីម) កែវជំរាបខ្ទប់ ទឹករ៉ឺយ៉ូត ទឹក ថង់ប្លាស្ទិច ជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិច និងក្រដាសចុងមាត់។



ដំណើរការ

- រៀបចំកែវជំរាប A, B និង C។
- កែវ A ដាក់បាយមួយដុំតូច ចំណែកតែមួយ និង C ដាក់បាយដែលកំនត់ក្នុងបរិមាណស្មើគ្នា។
- ដាក់អង់ស៊ីម ១០ml ចូលក្នុងកែវ A និងកែវ B (Pantyras-K មួយគ្រាប់ ដាក់ទឹក ១០ml)។
- បន្ទាប់មកបន្តក់សូលុយស្យុងរ៉ឺយ៉ូតទៅជ្រាបចំណាក់ក្នុងកែវទាំងបីដោះរួចកូរឱ្យសព្វក្រោយមកធ្វើការសង្កេត។

ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកអិច្វការពិសោធន៍របស់គ្រូប្រធានបទ និងបង្កើនល្បឿនរំលាយអាហារ

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីដំណើរការរំលាយអាហារ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ការរំលាយអាហារ ជាលំនាំនៃការបំបែកម៉ូលេគុលអាហារធំៗអោយទៅជាម៉ូលេគុលតូចៗ ដែលកោសិកាងាយស្រួលស្រូបបាន។ ដំណើរការរំលាយអាហារកើតឡើងចាប់ពីក្នុងមាត់រហូតដល់អាហារត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកោសិកាក្រោមទម្រង់ជាម៉ូលេគុលអាហារដើម្បីផ្តល់ជាថាមពលសម្រាប់សារពាង្គកាយទាំងមូល។ អាហារត្រូវបានរងនូវការបំបែកទៅជាដុំអាហារតូចៗនៅក្នុងបំពង់រំលាយអាហាររួមមាន មាត់ ដើមក បំពង់អាហារ ក្រពះ ពោះវៀនតូច ពោះវៀនធំ និងទ្វារធំដែលជាលំនាំនៃការបំបែកអាហារបែបមេកានិក។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នាដុំអាហារតូចៗក៏ត្រូវបានរងនូវការរំលាយទៅជាម៉ូលេគុលអាហារ

⁶ ប្រភពរូប៖ <https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/human-digestive-system-vector>.

ដោយក្រពេញវិលាយអាហាររួមមាន ក្រពេញទឹកមាត់ ថ្លើម លំពែង និងក្រពេញពោះវៀនតូច ដែលជា លំនាំវិលាយអាហារបែបគីមី។ សម្រូបម៉ូលេគុលអាហារ ឬសារធាតុចិញ្ចឹមជាលំនាំដែលកើតឡើងភាគ ច្រើននៅក្នុងពោះវៀនតូចតាមរយៈជ្រាំងពោះ វៀន និងតិចតួចនៅក្នុងពោះវៀនធំ។ ម៉ូលេគុលអាហារ ទាំងនោះត្រូវបានស្រូបទៅក្នុងសរសៃឈាមរួចបញ្ជូនទៅគ្រប់កោសិកានៃសារពាង្គកាយ។

3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើការវិលាយអាហារប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេច ?

៣.២ សម្មតិកម្ម

ចូរគូសសញ្ញា ✓ នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

លក្ខណៈកែវ	ប្រៃពណ៌	មិនប្រែប្រួល	សភាពអាហារ
A			គ្រាប់
B			រាវ
C			រាវ

៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍


សម្ភារ បាយស ថ្នាំ Tyrants-K (អង់ស៊ីម) កែវជ័រថ្នាំចំនួនបី ទឹកអ៊ីយ៉ូត ទឹក បង់ញាស្ទិច ជញ្ជីង អេឡិចត្រូនិក និងក្រដាសជូតមាត់។



រូប 2.6 សម្ភារពិសោធន៍វិធីបង្កើនល្បឿនវិលាយអាហារ

ដំណើរការ

- រៀបចំកែវជ័រថ្នាំ A B និងកែវ C។
- កែវ A ដាក់បាយមួយដុំតូច ចំណែកកែវ B និង កែវ C ដាក់បាយដែលកិនម៉ត់ (ដាក់ក្នុង បរិមាណស្មើគ្នា)។
- ដាក់សូលុយស្យុងអង់ស៊ីម 10ml ចូលក្នុងកែវ A B (សូលុយស្យុងអង់ស៊ីម Pantyras-K មួយគ្រាប់ ដាក់ទឹក 10ml)
- បន្ទាប់មកបន្តក់សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូតទៅប្រាំដំណក់ក្នុងកែវទាំងបីនោះរួចកូរឱ្យសព្វ ក្រោយមកធ្វើការសង្កេត។



រូប 2.7 ការរៀបចំកែវពិសោធន៍

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល

តារាង 2. 1 លទ្ធផលពិសោធន៍វិធីបង្កើនល្បឿនរំលាយអាហារ

លក្ខណៈកែវ	ប្រែពណ៌	មិនប្រែប្រួល	សភាពអាហារ
A	✓		គ្រាប់
B	✓		រាវ
C		✓	រាវ

លទ្ធផលពិសោធន៍បានបង្ហាញថាដុំបាយនៅក្នុងកែវ A ប្រែពណ៌ប៉ុន្តែមានសភាព និង ទ្រង់ទ្រាយនៅដាច់ដដែល នេះបញ្ជាក់ថាដុំបាយនោះមិនត្រូវបានបំបែកដោយអង់ស៊ីមទេ។ ចំពោះបាយនៅក្នុងកែវ B បានប្រែពណ៌ និងមានលក្ខណៈរាវ។ ចំណែកកែវ C បាយបានក្លាយជាសូលុយស្យុងរាវដែរ ប៉ុន្តែ មិនប្រែប្រួល ដូចកែវ B ទេនេះបញ្ជាក់ថាអង់ស៊ីម Pantyras-K មានឥទ្ធិពលទៅលើការបំបែកអាហារ (តារាង 2.1)។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

តាមរយៈលទ្ធផលពិសោធន៍ខាងលើ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាអង់ស៊ីមពិតជាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងដំណើរការបំបែកអាហារ ដែលជួយឱ្យអាហារមានសភាពប្រែប្រួលជាម៉ូលេគុលអាហារ។ ម៉្យាងទៀតដើម្បីឱ្យអាហារងាយត្រូវបានបំបែកដោយអង់ស៊ីម យើងត្រូវទំពារដុំអាហារឱ្យបានម៉ត់ល្អ។

សំណួរត្រិះរិះ

- ១) តើក្នុងកែវ A B និង C មានការរំលាយអាហារឬទេ? ចូរពន្យល់។
 - ចំពោះកែវ (A) មានការបំបែកតែមួយគឺ អង់ស៊ីម ដោយគ្មានការកិនបំបែក។ នោះបាយមានភាពជាគ្រាប់ៗ រួស ហើយរឹងដដែល។
 - ចំពោះកែវ (B) មានតែកិនបំបែក តែគ្មានអង់ស៊ីមចូលរួមនោះ សភាពបាយ ទន់ជ្រាយ។
 - ចំពោះកែវ (C) មានទាំងការកិនបាយ និងមានអង់ស៊ីមចូលរួម នោះសភាពបាយរាវបានសព្វល្អ ព្រោះមានការបំបែកខ្លាំង (បំបែកតាមមេកានិក និងបំបែកបែបគីមី)។

២) តើការរំលាយអាហារដែលល្អប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបណាខ្លះ?

ការរំលាយអាហារប្រព្រឹត្តទៅតាមពីរបែប:

- បែបមេកានិក: ជាការបំបែកអាហារពីដុំធំៗទៅជុំតូចៗគ្មានការចូលរួមពីអង់ស៊ីម។
- បែបគីមី: ជាការបំបែកអាហារពីដុំធំៗទៅតូចៗមានការចូលរួមពីអង់ស៊ីម ហើយកោសិកាអាចស្រូបយកអាហារទាំងនោះបាន។

ដូចនេះសម្រាប់ការរស់នៅជាក់ស្តែង យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលបរិភោគត្រូវទំពារអាហារទាំងនោះឱ្យបានម៉ត់ចត់ ទើបអាហាររបស់យើងឆាប់សម្រួប និងជម្រាបបានលឿន និងពិសេសជួយការពារប្រដាប់រំលាយអាហារមានវីធាន និងមានសុខភាពល្អប្រសើរ។

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ វិធីបង្កើនល្បឿនរំលាយអាហារ

1. វត្ថុបំណង
សង្កេតពីដំណើរការរំលាយអាហារ។
2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ការរំលាយអាហារ ជាលំនាំនៃការបំបែកម៉ូលេគុលអាហារធំៗអោយទៅជាម៉ូលេគុលតូចៗ ដែលកោសិកាងាយស្រួលបាន។ ដំណើរការរំលាយអាហារកើតឡើងចាប់ពីក្នុងមាត់រហូដល់អាហារត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកោសិកាក្រោមទម្រង់ជាម៉ូលេគុលអាហារដើម្បីផ្តល់ជាថាមពលសម្រាប់សាសរពាង្គកាយទាំងមូល។ អាហារត្រូវបានរងនូវការបំបែកទៅជាដុំអាហារតូចៗនៅក្នុងបំពង់រំលាយអាហាររួមមាន មាត់ ដើមក បំពង់អាហារ ក្រពះ ពោះវៀនតូច ពោះវៀនធំ និងទ្វារធំដែលជាលំនាំនៃការបំបែកអាហារបែបមេកានិក។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នាដុំអាហារតូចៗក៏ត្រូវបានរងនូវការរំលាយទៅជាម៉ូលេគុលអាហារដោយក្រពេញរំលាយអាហាររួមមាន ក្រពេញទឹកមាត់ ថ្លើម លំពែង និងក្រពេញពោះវៀនតូចដែលជាលំនាំរំលាយអាហារបែបគីមី។ សម្រូបម៉ូលេគុលអាហារ ឬសារធាតុចិញ្ចឹមជាលំនាំដែលកើតឡើងភាគច្រើននៅក្នុងពោះវៀនតូចតាមរយៈជ្រាំងពោះ វៀន និងតិចតួចនៅក្នុងពោះវៀនធំ។ ម៉ូលេគុលអាហារទាំងនោះត្រូវបានស្រូបទៅក្នុងសរសៃឈាមរួចបញ្ជូនទៅគ្រប់កោសិកានៃសារពាង្គកាយ។

3. សំណួរគន្លឹះ

.....

ចូរព្យាករណ៍ពីសភាពអាហារនៅក្នុងកែវទាំងបីនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដោយប្រើសញ្ញា។

លក្ខណៈកែវ	ប្រែពណ៌	មិនប្រែប្រួល	សភាពអាហារ
A			គ្រាប់
B			រាវ
C			រាវ


5. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ បាយស ថ្នាំ Pantyras-K (អង់ស៊ីម) កែវជ័រថ្នាំចំនួនបី ទឹកអ៊ុយ៉ុត ទឹក ថង់ប្លាស្ទិច ជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិក និងក្រដាសជូតមាត់។



ដំណើរការ

- រៀបចំកែវជំរឿង A B និងកែវ C។
- កែវ A ដាក់បាយមួយដុំតូច ចំណែកកែវ B និង C ដាក់បាយដែលកិនម៉ត់ក្នុងបរិមាណស្មើគ្នា។
- ដាក់អង់ស៊ីម 10ml ចូលក្នុងកែវ A និងកែវ B (Pantyras-K មួយគ្រាប់ ដាក់ទឹក 10ml)។
- បន្ទាប់មកបន្តក់សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូតប៊ីទៅប្រាំដំណាក់ក្នុងកែវទាំងបីនោះរួចកូរឱ្យសព្វក្រោយមកធ្វើការសង្កេត។



6. វិភាគលទ្ធផល

ចូរធ្វើការសង្កេត និងសរសេរលទ្ធផល ក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

លក្ខណៈកែវ	ប្រែពណ៌	មិនប្រែប្រួល	សភាពអាហារ
A			
B			
C			

7. សន្និដ្ឋាន

សំណួរត្រិះរិះ

១) តើក្នុងកែវ A B និង C មានការរំលាយអាហារ ឬទេ ? ចូរពន្យល់។

២) តើការរំលាយអាហារដែលល្អប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបណាខ្លះ ?

២.៣.មេរៀនពិសោធន៍៣

ព្រោក ADN ចេញពីផ្លែឈើទុំ

ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតម៉ាក្រូម៉ូលេគុល ADN ចេញពីផ្លែឈើទុំ (ចេកណាំវ៉ា ស្រូវប៊ែរី និងផ្លែប៉េងប៉ោះ)។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ADN ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុលនៃអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិច និងជាប៉ូលីមែរនុយក្លេអ៊ិចដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសារពង្សកាយ។ នៅក្នុងកោសិកានុយក្លេអ៊ិចបង្កើតឡើងពីអាស៊ីតផូស្វ័រិច (H_3PO_4) ស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{12}O_4$) និងបាសអាសូតហើយបង្កើតបានជាច្រវ៉ាក់ទ្វេ។ ម៉ូលេគុល ADN តូចណាស់ គេមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទេបានទេ។ តែយើងអាចព្រោកម៉ាក្រូម៉ូលេគុល ADN ក្រោមទម្រង់ជាប្រូតេអ៊ីនចេញពីកោសិកាបានដោយប្រើ អេតាណុល។ ម៉ូលេគុល ADN រលាយក្នុងកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់របស់អំបិល NaCl ឬសូលុយស្យុងអំបិលផ្សេងទៀត។ ឯសារធាតុផ្សេងទៀតមិនរលាយក្នុងកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់របស់អំបិលទេ។ សូលុយស្យុងសាប៊ូអាចជួយបំបែកសមាសធាតុខ្លាញ់ និងប្រូតេអ៊ីនដែលមានក្នុងភ្នាសណ្តែយ៉ូ និងភ្នាសកោសិកាអាចធ្វើឱ្យ ADN ចេញមកខាងក្រៅកោសិកាបាន។

3. ណែនាំដំណើរការពិសោធន៍

លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចនាំសិស្សធ្វើលើផ្លែឈើផ្សេងៗបន្ថែមទៀត

5. ដំណើរការពិសោធន៍
 សម្ភារៈ ដើងទម្រ បំពង់សាក ស្កររ៉ាប់(12ml) ស្កររ៉ាប់(20ml) កែវប៊ែរី ស្បែក ឬក្រណាត់អំបោះ ឬក្រដាសបោះ ចង់ហ្ស៊ីប (ចំនួន៣) កាំបិត អំបិល សាប៊ូលាងចាន ជ្រូញ អាល់កុល ទឹកសុទ្ធ។



ចំពោះសូលុយស្យុងអំបិល សាប៊ូ និងទឹក ត្រូវក្រឡុកឱ្យស្មើសាច់ល្អ។

* សូមប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ការប្រើប្រាស់កាំបិតដើម្បីកាត់យកវត្ថុសិក្សា។

ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកអិចូការពិសោធរបស់គ្រូ


ប្រធានបទ ព្រែក ADN ចេញពីផ្លែឈើទុំ

1. វត្ថុបំណង

ព្រែក ADN ចេញពីផ្លែចេកណាំវ៉ា ស្រូវប៊ែរី និងផ្លែប៉េងប៉ោះទុំ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

AND ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុលនៃអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិច និងជាប៉ូលីមែរនុយក្លេអូទីតដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសារពាង្គកាយ។ នៅក្នុងកោសិកានុយក្លេអូទីតបង្កឡើងពីអាស៊ីតផូស្វ័រិច (H_3PO_4) ស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{12}O_4$) និងបាសអាសូតហើយបង្កើតបានជាច្រវ៉ាក់ទ្វេ។ ម៉ូលេគុល ADN តូចណាស់គេមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបានទេ (រូប 2.8)⁷។ តែយើងអាចព្រែកម៉ាក្រូម៉ូលេគុល ADN ក្រោមទម្រង់ជាប្រូតេអ៊ីនចេញពីកោសិកាបានដោយប្រើអេតាណុល។ ម៉ូលេគុល ADN រលាយក្នុងកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់របស់អំបិល NaCl ឬសូលុយស្យុងអំបិលផ្សេងទៀតឯសារធាតុផ្សេងទៀតមិនរលាយក្នុងកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់របស់អំបិលទេ។ សូលុយស្យុងសាប៊ូអាចជួយបំបែកសមាសធាតុខ្លាញ់ និងប្រូតេអ៊ីន ដែលមានក្នុងភ្នាសណ្តែយ៉ូ និងភ្នាសកោសិកាអាចធ្វើឱ្យ ADN ចេញមកខាងក្រៅកោសិកាបាន។



រូប 2.8 ទម្រង់កោសិកា ក្រុមសូម និងសែន

3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើគេអាចព្រែកម៉ាក្រូម៉ូលេគុល ADN ចេញពីផ្លែឈើទុំបានយ៉ាងដូចម្តេច ?

៣.២ សម្មតិកម្ម

តាមរយៈបំពង់សាកខាងក្រោម សូមធ្វើការព្យាករណ៍ដោយបំពេញនូវលក្ខណៈរបស់កោសិកាចេកណាំវ៉ា ប៉េងប៉ោះ និងស្រូវប៊ែរីក្នុងសភាពធម្មតាមិនចាក់ទឹកអាល់កុល និងសភាពដែលចាក់ទឹកអាល់កុល តើនឹងមានអ្វីប្រែប្រួល ? បំពេញចូលនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖



រូប 2.9 ការព្យាករណ៍ពីការលេចឡើងនូវទម្រង់ ADN របស់ផ្លែប៉េងប៉ោះ ចេកណាំវ៉ា និងស្រូវប៊ែរី

⁷ ប្រភពរូប៖ <https://medicover-genetics.com/why-genetic-testing/>.

ប្រភេទកោសិកា	សង្កេតពីលក្ខណៈក្នុងបំពង់សាក	
	មិនចាក់អាល់កុល	ចាក់ទឹកអាល់កុល
ប៉េងប៉ោះ
ចេកណាំរ៉ា
ស្រូវប៊ែរី

៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ ជើងទម្រ បំពង់សាក ស៊ីរ៉ាំង (12ml) ស៊ីរ៉ាំង(20ml) កែវប៊ែរីស៊ី ស្បែក ឬក្រណាត់ អំបោះ ឬក្រដាសព្រោះ ថង់ហ្សឺប (ចំនួន៣) កាំបិត អំបិល សាប៊ូលាងចាន ជ្រូញ អាល់កុល ទឹកសុទ្ធ (រូប 2.10)។




រូប 2.10 សម្ភារពិសោធន៍ព្រឹក ADN ចេញពីផ្លែឈើទុំ

ដំណើរការ

- ផលិតសូលុយស្យុង អំបិល ទឹក និងសាប៊ូចូលគ្នាជាមុនសិនដាក់ក្នុងកែវមួយ (អំបិល 150g សាប៊ូ 80ml មីលីលីត្រ និងទឹក 200ml) កូរលាយបញ្ចូលគ្នាឱ្យសព្វ ក្លាយជាសូលុយស្យុងតែមួយ។
- យើងយកប៉េងប៉ោះមួយចំហៀង ស្រូវប៊ែរីពីរទៅបីគ្រាប់ (បើផ្លែតូចៗ) និងចេកមួយកំណាត់បើចេកមានផ្លែតូចៗ។
- យកផ្លែឈើខាងលើ ដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ផ្សេងៗគ្នា រួចធ្វើការច្របាច់វាឱ្យម៉ត់ល្អ។
- បន្ទាប់មកយើងយកសូលុយស្យុង អំបិល ទឹក និងសាប៊ូដែលបានរៀបចំខាងលើដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ហើយបាច់ និងក្រឡុកវាឱ្យសព្វម្តងទៀត។
- * **សម្ភារៈ** បូមសូលុយស្យុង (អំបិល ទឹក និងសាប៊ូ) ក្នុងបរិមាណផ្សេងគ្នាដូចខាងក្រោម៖
 - បូម 15ml នៃល្បាយប៉េងប៉ោះទុំ។
 - បូម 20ml នៃល្បាយចេកណាំរ៉ាទុំ។
 - បូម 15ml នៃល្បាយស្រូវប៊ែរីទុំ។
 - ក្រោយមកយើងយកស្បែក ឬក្រដាសព្រោះ ដើម្បីបោះសូលុយស្យុងទាំងបីប្រភេទ។
 - ដំណាក់កាលបន្ទាប់យើងបូមសូលុយស្យុងដែលបានបោះរួចហើយទាំងបីប្រភេទដាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់សាកផ្សេងៗគ្នា (3ml ទៅ 5ml) ត្រូវបានចែកវាជា២ករណី៖
 - បំពង់សាក (A) អត់ចាក់អាល់កុលចូលទេ។
 - បំពង់សាក (B) ចាក់អាល់កុលចូល។ (ដូចមានបង្ហាញក្នុងលទ្ធផលខាងក្រោម)

- ដំណាក់កាលបញ្ចប់យើងបូមយកអាល់កុល (3ml ទៅ 4ml) ចាក់ចូលក្នុងកែវឱ្យគ្រប់ នៃវត្ថុសិក្សាដែលបានរៀបចំដាក់ក្នុងបំពង់សាកខាងលើ។

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល



រូប2.11 លទ្ធផលពិសោធន៍អំពី ញែក ADN ចេញពីផ្លែឈើទុំ

ប្រភេទកោសិកា	សង្កេតពីលក្ខណៈក្នុងបំពង់សាក	
	A (អត់ចាក់អាល់កុលចូល)	B (ចាក់អាល់កុលចូល)
ប៉េងប៉ោះទុំ	គ្មានជុំសសៃអណ្តែតឡើង	មានជុំសសៃអណ្តែតឡើង
ចេកណាំវ៉ាទុំ	គ្មានជុំសសៃអណ្តែតឡើង	មានជុំសសៃអណ្តែតឡើង
ស្រូវប៊ែរីទុំ	គ្មានជុំសសៃអណ្តែតឡើង	មានជុំសសៃអណ្តែតឡើង

តារាង 2. 2 លក្ខណៈរបស់ ADN ផ្លែឈើទុំនៅក្នុងបំពង់សាកនីមួយៗ

- លទ្ធផលបានបង្ហាញថាគ្រប់បំពង់សាក A ទាំងអស់ (ប៉េងប៉ោះ ចេកណាំវ៉ា និងស្រូវប៊ែរី) ដែលមិនបានចាក់អាល់កុលចូលគ្មានជុំសសៃអណ្តែតឡើងផ្ទៃលើនៃសូលុយស្យុងទេ។
- ផ្ទុយមកវិញគ្រប់បំពង់សាក B ទាំងអស់ដែលបានចាក់អាល់កុលចូលយើងសង្កេតឃើញថាមានជុំសសៃតូចៗអណ្តែតឡើងផ្ទៃលើនៃសូលុយស្យុង។ លទ្ធផលបំពង់សាក A បញ្ជាក់ថា DNA មិនត្រូវបានរុញឡើងលើផ្ទៃសូលុយស្យុងដោយអាល់កុល ជាហេតុធ្វើឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញពីទម្រង់ជាសសៃរបស់វាបាន។ នៅក្នុងបំពង់សាក B អាល់កុលបានរុញសសៃ DNA ឱ្យអណ្តែតឡើងលើផ្ទៃសូលុយស្យុងជាហេតុធ្វើឱ្យយើងសង្កេតមើលឃើញច្បាស់ពីទម្រង់របស់វា។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

តាមរយៈការពិសោធន៍ខាងលើ យើងសន្និដ្ឋានបានថាសូលុយស្យុងអំបិល និងសាប៊ូអាចបំបែក ក្លាសកោសិកា និងក្លាសណ្ឌូយ៉ូដែលអាចអោយយើងមើលឃើញ បណ្តុំម៉ាក្រូម៉ូលេគុល ADN ដែលមាន ពណ៌សអណ្តែតនៅលើផ្ទៃអាល់កុល។

សំណួរពិភាក្សា

- ១) ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ប្របាច់ផ្លែទុំ (ចេក ស្រូវប៊ែរី និងប៉េងប៉ោះ) ឱ្យមត់?
 ព្រោះដើម្បីបំបែក ឬផ្តាច់កោសិកានីមួយៗឱ្យចេញពីគ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបំបែកក្លាស
 កោសិកាក្នុងពេលដាក់សូលុយស្យុងអំបិល និងសាប៊ូចូល។
- ២) តើសាប៊ូមាននាទីអ្វីក្នុងការធ្វើការពិសោធនេះ?
 សាប៊ូជាសារធាតុជួយបំបែក និងបំផ្លាញ សមាសធាតុខ្លាញ់ ប្រូតេអ៊ីន ក្លាសណ្ឌូយ៉ូ និងក្លាស
 កោសិកា ដើម្បីដោះ និងបញ្ចេញ ADN មកខាងក្រៅ។ វាធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីន ខ្លាញ់ និងផូស្វ័រលីពីតអាច
 រលាយបាន។
- ៣) តើអាល់កុលមាននាទីអ្វីក្នុងការធ្វើការពិសោធនេះ?
 អាល់កុលបានជួយចងក្រងសម្ព័ន្ធគីមីក្រូម៉ូសូម ទៅជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុល ADN ដែលអាចឱ្យយើង
 មើលឃើញបណ្តុំសរសៃពណ៌សអណ្តែតឡើង និងជួយក្នុងការព្រែក AND ចេញ។
- ៤) តើអាល់កុលមាននាទីអ្វីក្នុងការធ្វើការពិសោធនេះ?
 អំបិលជាសារធាតុជួយឱ្យ ADN រលាយក្នុងកំហាប់អំបិលខ្ពស់រួមនិងជួយក្នុងការព្រែក ឬផ្តាច់
 ADN ចេញពីប្រូតេអ៊ីនអ៊ីស្តូន។


ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកអិច្វីការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ ព្រែក ADN ចេញពីផ្លែឈើទុំ

- 1. វត្ថុបំណង
 ព្រែក ADN ចេញពីផ្លែចេកណាំវ៉ា ស្រូវប៊ែរី និងផ្លែប៉េងប៉ោះទុំ។

- 2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ADN ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុលនៃអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិច និងជាប៉ូ
 លីមែរនុយក្លេអ៊ិចដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសារពាង្គកាយ។ នៅ
 ក្នុងកោសិកានុយក្លេអ៊ិចបង្កឡើងពីអាស៊ីតផូស្វ័រិច (H_3PO_4)
 ស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{12}O_4$) និង បាសអាសូតហើយបង្កើត
 បានជាប្រាក់កំទេ។ ម៉ូលេគុល ADN តូចណាស់ គេមិនអាចមើល
 ឃើញវាដោយភ្នែកទទេបានទេ។ តែយើងអាចព្រែកម៉ាក្រូម៉ូលេ
 គុល ADN ក្រោមទម្រង់ជាប្រូតេអ៊ីនចេញពីកោសិកាបានដោយ
 ប្រើ អេតាណុល។ ម៉ូលេគុល ADN រលាយក្នុងកំហាប់សូលុយ
 ស្យុងខ្ពស់របស់អំបិល NaCl ឬសូលុយស្យុងអំបិលផ្សេងទៀត។
 ឯសារធាតុផ្សេងទៀតមិនរលាយក្នុងកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់
 របស់អំបិលទេ។ សូលុយស្យុងសាប៊ូអាចជួយបំបែកសមាសធាតុខ្លាញ់ និងប្រូតេអ៊ីន ដែលមានក្នុងក្លាស
 ណ្ឌូយ៉ូ និងក្លាសកោសិកាអាចធ្វើឱ្យ ADN ចេញមកខាងក្រៅកោសិកាបាន។



- 3. សំណួរគន្លឹះ

.....

តាមរយៈបំពង់សាកខាងក្រោម សូមធ្វើការព្យាករណ៍ដោយបំពេញនូវលក្ខណៈរបស់កោសិកា ចេកណាំវ៉ា ប៉េងប៉ោះ និងស្រូវប៊ែរីក្នុងសភាពធម្មតាមិនចាក់ទឹកអាល់កុល និងសភាពដែលចាក់ទឹកអាល់កុល តើនឹងមានអ្វីប្រែប្រួល? បំពេញចូលនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖



ប្រភេទ កោសិកា	សង្កេតពីលក្ខណៈក្នុងបំពង់សាក	
	មិនចាក់អាល់កុល	ចាក់ទឹកអាល់កុល
ប៉េងប៉ោះ
ចេកណាំវ៉ា
ស្រូវប៊ែរី

5. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ ជើងទម្រ បំពង់សាក ស៊ីរ៉ាំង (12 ml) ស៊ីរ៉ាំង (20 ml) កែវប៊ែរីស៊ី ស្បែក ឬក្រណាត់ អំបោះ ឬក្រដាសព្រោះ ចង់ហ្ស៊ីប (ចំនួន៣) កាំបិត អំបិល សាប៊ូលាងចាន ជ្រុញ អាល់កុល ទឹកសុទ្ធ។



ដំណើរការ

- ផលិតសូលុយស្យុង អំបិល ទឹក និងសាប៊ូចូលគ្នាជាមុនសិនដាក់ក្នុងកែវមួយ (អំបិល 150 g សាប៊ូ 80 ml មីលីលីត្រ និងទឹក 200 ml) កូរលាយបញ្ចូលគ្នាឱ្យសព្វ ក្លាយជាសូលុយស្យុងតែមួយ។
- យើងយកប៉េងប៉ោះមួយចំហៀង ស្រូវប៊ែរីពីរទៅបីគ្រាប់ (បើផ្លែតូចៗ) និងចេកមួយកំណាត់បើចេកមានផ្លែតូចៗ)។
- យកផ្លែឈើខាងលើ ដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ផ្សេងៗគ្នា រួចធ្វើការច្របាច់វាឱ្យមត់ល្អ។
- បន្ទាប់មកយើងយកសូលុយស្យុង អំបិល ទឹក និងសាប៊ូដែលបានរៀបចំខាងលើដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ហើយបាច់ និងក្រឡុកវាឱ្យសព្វម្តងទៀត។

****សម្គាល់៖** បូមសូលុយស្យុង (អំបិល ទឹក និងសាប៊ូ) ក្នុងបរិមាណផ្សេងគ្នាដូចខាងក្រោម៖

- បូម 15 ml នៃល្បាយប៉េងប៉ោះទុំ។
- បូម 20 ml នៃល្បាយចេកណាំវ៉ាទុំ។
- បូម 15 ml នៃល្បាយស្រូវប៊ែរីទុំ។
- ក្រោយមកយើងយកស្រូវ ឬក្រដាសច្រោះ ដើម្បីច្រោះសូលុយស្យុងទាំងបីប្រភេទ។
- ដំណាក់កាលបន្ទាប់យើងបូមសូលុយស្យុងដែលបានច្រោះរួចហើយទាំងបីប្រភេទដាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់សាកផ្សេងៗគ្នា (3 ml ទៅ 5 ml) ត្រូវបានចែកវាជា២ករណី៖
- បំពង់សាក (A) អត់ចាក់អាល់កុលចូលទេ។
- បំពង់សាក (B) ចាក់អាល់កុលចូល (ដូចមានបង្ហាញក្នុងលទ្ធផលខាងក្រោម)។
- ដំណាក់កាលបញ្ចប់យើងបូមយកអាល់កុល (3 ml ទៅ 4 ml) ចាក់ចូលក្នុងកែវឱ្យគ្រប់នៃវត្ថុសិក្សាដែលបានរៀបចំដាក់ក្នុងបំពង់សាកខាងលើ។

6. វិភាគលទ្ធផល

ប្រភេទ កោសិកា	សង្កេតពីលក្ខណៈក្នុងបំពង់សាក	
	A (គ្មានអាល់កុល)	B (មានអាល់កុល)
ប៉េងប៉ោះ
ចេកណាំវ៉ា
ស្រូវប៊ែរី

7. សន្និដ្ឋាន

សំណួរត្រិះរិះ

១) ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ច្របាច់ផ្លែទុំ (ចេក ស្រូវប៊ែរី និងប៉េងប៉ោះ) ឱ្យម៉ត់?

២) តើសារធាតុមាននាទីអ្វីក្នុងការធ្វើការពិសោធនេះ?

៣) តើអាល់កុលមាននាទីអ្វីក្នុងការធ្វើការពិសោធនេះ?

៤) តើអំបិលមាននាទីអ្វីក្នុងការធ្វើការពិសោធនេះ?

២.៤.មេរៀនពិសោធន៍៤

បាតុភូតអូស្មូស

ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍


1. វត្ថុបំណង

សង្កេតបាតុភូតទឹកចេញ និងទឹកចូលក្នុងកោសិកាវត្តជាតិ។


2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

នៅក្នុងសារពាងកាយការវស់ បាតុភូតអូស្តូសកើតមាននៅគ្រប់កោសិកាទាំងអស់។ បាតុភូតអូស្តូសកើតឡើងនៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងកោសិកា និងក្រៅកោសិកាមានសម្ពាធមិនស្មើគ្នា។ នៅក្នុងកោសិការុក្ខជាតិវ៉ាកុយអូលមាននាទីស្តុកទុកនូវរុក្ខរស ដែលភាគច្រើនជាម៉ូលេគុលទឹក។ នៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកខាងក្នុងកោសិកាទាបជាងម៉ូលេគុលទឹកខាងក្រៅកោសិកាធ្វើឱ្យទឹកចូល ជាហេតុនាំឱ្យវ៉ាកុយអូលប៉ោងធំដែលប៉ាតុភូតនេះហៅថាដេញស្នូលីស។ ផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកខាងក្នុងកោសិកាខ្ពស់ជាងម៉ូលេគុលទឹកខាងក្រៅកោសិកាធ្វើឱ្យទឹកចេញ ជាហេតុនាំឱ្យវ៉ាកុយអូលរួមតូចដែលប៉ាតុភូតនេះហៅថា ញាស្នូលីស។ នៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងវ៉ាកុយអូល និងម៉ូលេគុលទឹកនៅខាងក្រៅកោសិកាមានសម្ពាធម្មតា ឬបរិមាណស្មើគ្នាធ្វើឱ្យម៉ូលេគុលទឹកអចលនាឬអលំហូរដែលប៉ាតុភូតនេះហៅថាគួសេសង់។

នៅលើសន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់សិស្សសូមកុំដាក់រូបភាពខាងក្រោមនេះចូល ព្រោះប្រទេសនេះជាការបង្ហាញពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានរបស់គ្រូ។



បម្រុងប្រយ័ត្ន!
 ណែនាំឱ្យសិស្សបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងការច្រឡំចំពោះកោសិការុក្ខជាតិដោយសារក្លាស់សែលុយឡូសធ្វើឱ្យកោសិកាមិនប្រែប្រួលទម្រង់ទេ ប៉ុន្តែប្រែប្រួលតែទៅលើទំហំវ៉ាកុយអូលដែលយើងអាចពិនិត្យឃើញច្បាស់នៅក្នុងមីក្រូទស្សន៍។ ចំពោះកោសិកាខ្លឹមបារាំងដែលបានត្រាំក្នុងទឹកធម្មតា យើងមើលមិនឃើញទម្រង់វ៉ាកុយអូលទេ ព្រោះវាបានរីកប៉ោងជាប់ទៅនឹងក្លាស់សែលុយឡូស។ ចំណែកកោសិកាខ្លឹមបារាំងដែលបានត្រាំក្នុងសូលុយស្យុងយើងអាចសង្កេតឃើញច្បាស់នូវទម្រង់ផ្ទៃរបស់វា។ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននូវការកំណត់ច្រឡំរវាងរូបតំណក់ទឹក និងវ៉ាកុយអូលនៅពេលសង្កេតមើលក្នុងមីក្រូទស្សន៍ (ដូចរូបខាងក្រោម)។




**ផ្នែកទី២ ៖ សេចក្តីណែនាំសន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ
ប្រធានបទ បាតុភូតអូស្តូស**

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតបាតុភូតទឹកចេញ និងទឹកចូលក្នុងកោសិការុក្ខជាតិ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

នៅក្នុងសារពាង្គកាយការវស់ បាតុភូតអូស្តូសកើតមាននៅគ្រប់កោសិកាទាំងអស់។ បាតុភូតអូស្តូសកើតឡើងនៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងកោសិកា និងក្រៅកោសិកាមានសម្ពាធមិនស្មើគ្នា។ នៅក្នុងកោសិការុក្ខជាតិវ៉ាកុយអូលមាននាទីស្តុកទុកនូវរុក្ខរស ដែលភាគច្រើនជាម៉ូលេគុលទឹក។ នៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកខាងក្នុងកោសិកាទាបជាងម៉ូលេគុលទឹកខាងក្រៅកោសិកាធ្វើឱ្យទឹកចូល ជាហេតុនាំឱ្យវ៉ាកុយអូលប៉ោងធំដែលបាតុភូតនេះហៅថាដេញស្នូលីស។ ផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកខាងក្នុងកោសិកាខ្ពស់ជាងម៉ូលេគុលទឹកខាងក្រៅកោសិកាធ្វើឱ្យទឹកចេញ ជាហេតុនាំឱ្យវ៉ាកុយអូលរួមតូចដែលបាតុភូតនេះហៅថាញាស្នូលីស។ នៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងវ៉ាកុយអូល និងម៉ូលេគុលទឹកនៅខាងក្រៅកោសិកាមានសម្ពាធម្មតា ឬបរិមាណស្មើគ្នាធ្វើឱ្យម៉ូលេគុលទឹកអចលនាឬអលំហូរដែលបាតុភូតនេះហៅថាគ្នសេសង់។



3. ណែនាំដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើទឹកចេញ និងចូលក្នុងកោសិកាដូចម្តេច?

៣.២ សម្មតិកម្ម

ចូរគូសសញ្ញា ✓ នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ទីតាំងត្រាំកោសិកា	សភាពកោសិកា	
	ស្វិត	រីកធំ
ក្នុងទឹកធម្មតា		
ក្នុងសូលុយស្យុងអំបិល		

៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

កែវជ័រពីរ ហ្វឺតសរសេរ កាំបិត ខ្លឹមបារាំង កាំបិតវះកាត់ (surgical blade) ពីប៉ែត ដង្កៀប ឈើចាក់ធ្មេញ ទឹក អំបិល និងមីក្រូទស្សន៍ (រូប 2.12)។




រូប 2. 12 សម្ភារពិសោធអំពីបាតុភូតអូសូស

ដំណើរការ

- រៀបចំកែវទឹកពីរដែលមួយជាកែវទឹកធម្មតា និងមួយទៀតជាកែវសូលុយស្យុងអំបិលរួចសរសេរឈ្មោះនៅលើកែវទាំងពីរ។
- កាត់មើមខ្លឹមបារាំងជាបួនដុំដាក់ត្រាំក្នុងកែវទឹកធម្មតា និងត្រាំក្នុងសូលុយស្យុងអំបិលរយៈពេល ១០ ទៅ ១៥ នាទី។
- ប្រើដង្ហៀបចាប់យកខ្លឹមបារាំងពីក្នុងកែវទឹក ហើយឆ្លុះយកស្រទាប់ខាងក្នុងដាក់លើបន្ទះឡាម រួចគ្របឡាមែលពីលើ បន្ទាប់មកយកទៅពិនិត្យមើលក្នុងមីក្រូទស្សន៍។
- ធ្វើដូចចំណុចខាងលើម្តងទៀតសម្រាប់ខ្លឹមបារាំងដែលត្រាំក្នុងសូលុយស្យុងអំបិល។

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល



រូប 2. 13 ទម្រង់កោសិកាខ្លឹមបារាំងត្រាំក្នុងទឹក និងត្រាំក្នុងសូលុយស្យុងអំបិល
តារាង 2. 3 សភាពកោសិកាដែលបានត្រាំក្នុងទឹកធម្មតា និងសូលុយស្យុងអំបិល

ទីតាំងត្រាំកោសិកា	សភាពកោសិកា	
	ស្វិត	រីកធំ
ក្នុងទឹកធម្មតា		
ក្នុងសូលុយស្យុងអំបិល		

ផ្អែកលើលទ្ធផលពិសោធបង្ហាញថា កោសិកាខ្លឹមបារាំងដែលបានត្រាំនៅក្នុងទឹកធម្មតា មានសភាពប៉ោងរីកធំ នេះបញ្ជាក់ថាទឹកក្នុងកែវបន្សាយចូលទៅក្នុងកោសិកាខ្លឹមបារាំង ដែលបណ្តាលមកពីកំហាប់ម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងកែវខ្ពស់ជាកំហាប់ម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងកោសិកា (តារាង 2.3)។ ចំណែកកោសិកាខ្លឹមបារាំងដែលបានត្រាំនៅក្នុងសូលុយស្យុងអំបិលមានសភាពស្វិតរួមគ្នា ដែលនេះ

បញ្ជាក់ថាទឹកនៅក្នុងកោសិកាបានបន្សាយ ចេញទៅក្នុងសូលុយស្យុង ដែលបណ្តាលមកពីកំហាប់ម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងកោសិកាខ្លីមធ្យមខ្ពស់ជាងកំហាប់ម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងសូលុយស្យុង។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

ផ្អែកតាមលទ្ធផលខាងលើ យើងធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាទឹកបន្សាយចូលក្នុងកោសិកានៅពេលដែលកំហាប់ម៉ូលេគុលទឹកក្នុងកោសិកាទាបជាងកំហាប់ម៉ូលេគុលទឹកខាងក្រៅកោសិកា ហើយទឹកចេញពីកោសិកានៅពេលដែលកំហាប់ម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងកោសិកាខ្ពស់ជាងកំហាប់ម៉ូលេគុលទឹកខាងក្រៅកោសិកា។

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្និកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ បាតុភូតអូស្មូស

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតបាតុភូតទឹកចេញ និងទឹកចូលក្នុងកោសិការុក្ខជាតិ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

នៅក្នុងសារពាងកាយការវេស បាតុភូតអូស្មូសកើតមាននៅគ្រប់កោសិកាទាំងអស់។ បាតុភូតអូស្មូសកើតឡើងនៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងកោសិកា និងក្រៅកោសិកាមានសម្ពាធមិនស្មើគ្នា។ នៅក្នុងកោសិការុក្ខជាតិវាគុយអូលមាននាទីស្តុកទុកនូវរុក្ខវេស ដែលភាគច្រើនជាម៉ូលេគុលទឹក។ នៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកខាងក្នុងកោសិកាទាបជាងម៉ូលេគុលទឹកខាងក្រៅកោសិកាធ្វើឱ្យទឹកចូល ជាហេតុនាំឱ្យវាគុយអូលប៉ោងធំដែលប៉ាតុភូតនេះហៅថាដេញស្នូលីស។ ផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកខាងក្នុងកោសិកាខ្ពស់ជាងម៉ូលេគុលទឹកខាងក្រៅកោសិកាធ្វើឱ្យទឹកចេញ ជាហេតុនាំឱ្យវាគុយអូលរួមតូចដែលប៉ាតុភូតនេះហៅថាញាស្នូលីស។ នៅពេលដែលម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងវាគុយអូល និងម៉ូលេគុលទឹកនៅខាងក្រៅកោសិកាមានសម្ពាធមើគ្នា ឬបរិមាណស្មើគ្នាធ្វើឱ្យម៉ូលេគុលទឹកអចលនាឬអលំហូរដែលប៉ាតុភូតនេះហៅថាត្រូវសេសសង់។

3. សំណួរគន្លឹះ

.....

4. សម្មតិកម្ម

ចូរគូសសញ្ញា ✓ នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ទីតាំងត្រាំកោសិកា	សភាពកោសិកា	
	ស្វិត	រីកធំ
ក្នុងទឹកធម្មតា		
ក្នុងសូលុយស្យុងអំបិល		

5. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

កែវជ័រពីរ ហ្វឺតសរសេរ កាំបិត ខ្លឹមបារាំង ដង្កៀប ឈើចាក់ធ្មេញ ទឹក អំបិល និងមីក្រូទស្សន៍។



ដំណើរការ

- រៀបចំកែវទឹកពីរដែលមួយជាកែវទឹកធម្មតា និងមួយទៀតជាកែវសូលុយស្យុងអំបិល។
- កាត់មើមខ្លឹមបារាំងជាបួនដុំដាក់ត្រាំក្នុងកែវទឹកធម្មតា និងត្រាំក្នុងសូលុយស្យុងអំបិលរយៈពេល១០ ទៅ ១៥ នាទី។
- ប្រើដង្កៀបចាប់យកខ្លឹមបារាំងពីក្នុងកែវទឹក ហើយឆ្លុះយកស្រទាប់ខាងក្នុងដាក់លើបន្ទះឡាម រួចគ្របឡាមែលពីលើ បន្ទាប់មកយកទៅពិនិត្យមើលក្នុងមីក្រូទស្សន៍។
- ធ្វើដូចចំណុចខាងលើម្តងទៀតសម្រាប់ខ្លឹមបារាំងដែលត្រាំក្នុងសូលុយស្យុងអំបិល។

6. វិភាគលទ្ធផល

ចូរគូររូបកោសិកាខ្លឹមបារាំងដែលបានត្រាំក្នុងទឹកធម្មតា និងរូបកោសិកាខ្លឹមបារាំងដែលបានត្រាំក្នុងសូលុយស្យុងអំបិល។

.....

.....

7. សន្និដ្ឋាន

.....

.....

២.៥.មេរៀនពិសោធន៍៥

ដំណើរដង្ហើមកោសិការបស់រុក្ខជាតិ

ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតដំណើរដង្ហើមកោសិការបស់រុក្ខជាតិ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន



រុក្ខជាតិជាការរស់ស្ងួយដីព ដែលមានលទ្ធភាពផលិតអាហារដោយខ្លួនឯងបាន ក្រោមដំណើររស្មីសំយោគ វាក៏មានដំណើរដង្ហើមកោសិកាគ្រប់ពេលវេលាដូចទៅនឹងការរស់ដទៃទៀតដែរ។

ប្រតិកម្មដង្ហើម៖ $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ថាមពល (ATP)}$ ។

ជាទូទៅផលិតផលដង្ហើមរបស់រុក្ខជាតិ CO_2 ត្រូវបានកោសិការុក្ខជាតិទាញយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើររស្មីសំយោគទាំងអស់ ឬស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ប្រតិកម្មរស្មីសំយោគ $6CO_2 + 12H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$ ។

ត្រូវអាចធ្វើទុកមុន ដើម្បីបង្ហាញជាលទ្ធផលពិសោធតែម្តង
ដើម្បីសន្សំពេលវេលា។ តែក៏អាចឱ្យសិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល នៅ
ថ្ងៃបន្ទាប់ដែរ។



បម្រុងប្រយ័ត្ន!

ពេលផ្ទេរឧស្ម័ន ត្រូវច្រកមាត់បង់
ធំ (បង់ A B)
ចូលក្នុងមាត់បង់តូច (បង់ a b)

ដំណើរការពិសោធន៍

- កាត់ជើងម្សៅជាតិផ្នែកចុងចុង 3 ឬ 4 ដើម រួចយកក្រដាសពូតមាត់បង់ដាក់ចូល
គល់ដោយជ្រលក់ទឹកឱ្យស្របបន្តិច
- ច្រកដើម្បីជាតិចូលចំណី A រួចបកយកខ្យល់ពីបរិយាកាសឱ្យពេញ រួច
ចងខ្សែទឹក
- យកថង់ B (ថង់ 200g) បកយកខ្យល់ពីបរិយាកាសឱ្យពេញ រួចចងខ្សែទឹក
- យកខ្សែគ្របប្រអប់លើថង់ A ទុកក្នុងទឹកជិតចម្រុះទម្រង់
- បូមទឹកកំលាយក្នុងថង់ a និង b (ថង់ 200g)
- ផ្ទេរខ្យល់ពីថង់ A ចូលទៅក្នុងថង់ a ដោយត្រូវថង់ a ជួបវា ដើម្បីឱ្យឧស្ម័ន
នរណាមួយចូលក្នុងទឹកកំលាយ
- ផ្ទេរខ្យល់ពីថង់ B ចូលទៅក្នុងថង់ b ដោយត្រូវថង់ b ជួបវា ដើម្បីឱ្យឧស្ម័ន
នរណាមួយចូលក្នុងទឹកកំលាយ



សង្កេតលទ្ធផលនៃថង់ a និង b

**ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធបស់គ្រូ
ប្រធានបទ ដំណើរដង្ហើមកោសិការបស់រុក្ខជាតិ**

1. វត្ថុបំណង
សង្កេតដំណើរដង្ហើមកោសិការបស់រុក្ខជាតិ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

រុក្ខជាតិជាការវស់ស្ងួយដ៏ពិបាក ដែលមានលទ្ធភាពផលិតអាហារ ដោយខ្លួនឯងបានក្រោមដំណើររស្មីសំយោគ វាក៏មានដំណើរដង្ហើម កោសិកាគ្រប់ពេលវេលាដូចទៅនឹងការវស់ដទៃទៀតដែរ។ ប្រតិកម្ម ដង្ហើម $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ ថាមពល (ATP)។ ជាទូទៅផលិតផលដង្ហើមរបស់រុក្ខជាតិ CO_2 ត្រូវបានកោសិកា រុក្ខជាតិទាញយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើររស្មីសំយោគទាំងអស់ ឬស្ទើរ តែទាំងអស់នៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រតិកម្មរស្មីសំយោគ



3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើដំណើរដង្ហើមកោសិការបស់រុក្ខជាតិប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេច ?

៣.២ សម្មតិកម្ម


តើស្បែងមួយណានឹងមានវត្តមាន CO_2 ក្រោយពេលទុកមួយយប់ ?

.....

៣.៣ ដំណើរការ

សម្ភារ

ថង់ប្លាស្ទិចថ្លាចំណុះ 2K g ថង់ប្លាស្ទិចថ្លាចំណុះ 200 g កៅស៊ូកង រុក្ខជាតិ ប្រអប់ឡាំង ហ្វឺត ឬស្ពតក្រដាស។



ដំណើរការ

- កាត់ដើមរុក្ខជាតិផ្នែកខាងចុង 3 ឬ 4 ដើម រួចយកក្រដាស ជូតមាត់ផ្នែកគល់ដោយជ្រលក់ទឹកឱ្យសើម បន្តិច។
- ច្រកដើមរុក្ខជាតិចូលថង់ A រួចបក់យកខ្យល់ពីបរិយាកាស ឱ្យពេញ រួចចងឱ្យជិត។
- យកថង់ B (ថង់ 2Kg) បក់យកខ្យល់ពីបរិយាកាសឱ្យពេញ រួចចងឱ្យជិត ។
- យកឡាំងគ្របពីលើថង់ទាំងពីរទុកក្នុងទីងងឹតចំនួន១យប់
- បូមទឹកកំបោរថ្លាបញ្ចូលថង់ a និង b (ថង់ 200g)
- ផ្ទេរខ្យល់ពីថង់ A ចូលទៅក្នុងថង់ a ដោយគ្រវីថង់ a ថ្មី មៗ ដើម្បីឱ្យឧស្ម័ន រលាយចូលក្នុងទឹក កំបោរ។
- ផ្ទេរខ្យល់ពីថង់ B ចូលទៅក្នុងថង់ b

- ដោយគ្រវីចង់ b ថ្មមៗ
ដើម្បីឱ្យឧស្ម័នរលាយចូលក្នុងទឹកកំបោរ។
- សង្កេតលទ្ធផលនៃចង់ a និង b។



រូប 2.14 ដំណើរការពិសោធអំពី
ដំណើរដង្ហើមកោសិការបស់រុក្ខជាតិ

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល

តារាង 2. 4 លទ្ធផលស្តីពីលក្ខណៈរបស់ចង់ពិសោធរបស់ A និង B។

	ចង់ A (a)	ចង់ B (b)
វត្តមាន CO ₂	មាន	គ្មាន
ស្ថានភាពទឹកកំបោរ	ល្អក់	ថ្លា

យោងតាមលទ្ធផលពិសោធរុក្ខជាតិមានដំណើរដង្ហើមកោសិកា ដោយវាប្រើវត្តមាន O₂ ក្នុងបរិយាកាសនៅពេលដែលគ្មានពន្លឺ ហើយវាបញ្ចេញ CO₂ ដែលជាផលិតផលដង្ហើមកក្នុងបរិយាកាសវិញ ប៉ុន្តែពេលមានពន្លឺរុក្ខជាតិប្រើ O₂ ដែលបានមកពីផលិតផលរស្មីសំយោគ។ ដូចនេះ សម្មតិកម្មដែលថា ចង់ A មានវត្តមាន CO₂ ពិតជាគាំទ្រដោយពិសោធរ (តារាង 2.4)។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

ដូចនេះរុក្ខជាតិមានដំណើរដង្ហើមកោសិកាដោយវាប្រើប្រាស់ O₂ ហើយបញ្ចេញមកវិញនូវ CO₂។ សំណួរត្រិះរិះ

១) តើឧស្ម័ន CO₂ ដែលបញ្ចេញដោយរុក្ខជាតិផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់បម្រែបម្រួលបរិយាកាសដែរ ឬទេ? ហេតុអ្វី?

.....

២) តើរុក្ខជាតិធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃឧស្ម័ន CO₂ ដូចម្តេច? ចូរពន្យល់។

.....


ផ្នែកទី ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ ដំណើរដង្ហើមកោសិការបស់រុក្ខជាតិ

1. វត្ថុបំណង
សង្កេតដំណើរដង្ហើមកោសិការបស់រុក្ខជាតិ។


2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

រុក្ខជាតិជាការវស់ស្ងួយដ៏ព ដែលមានលទ្ធភាពផលិតអាហារដោយខ្លួនឯងបានក្រោមដំណើររស្មីសំយោគ វាក៏មានដំណើរដង្ហើមកោសិកាគ្រប់ពេលវេលាដូចទៅនឹងការវស់ដទៃទៀតដែរ។ ប្រតិកម្មដង្ហើម $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ថាមពល (ATP)}$ ។ ជាទូទៅផលិតផលដង្ហើមរបស់រុក្ខជាតិ CO₂ ត្រូវបានកោសិការុក្ខជាតិទាញយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើររស្មីសំយោគទាំង



3. សំណួរគន្លឹះ

4. សម្មតិកម្ម



តើស្បែងមួយណានឹងមានវត្តមាន CO_2 ក្រោយពេលទុកមួយយប់?

.....

.....

.....


5. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

ថង់ប្លាស្ទិចថ្លាចំណុះ 2 Kg ថង់ប្លាស្ទិចថ្លាចំណុះ 200 g កៅស៊ូកង រុក្ខជាតិ ប្រអប់ឡាំង ហ្វឺត ឬស្កុតក្រដាស។

ដំណើរការ

- កាត់ដើមរុក្ខជាតិផ្នែកខាងចុង 3 ឬ 4 ដើម រួចយកក្រដាសជូតមាត់រុក្ខជាតិ។
- គល់ដោយជ្រលក់ទឹកឱ្យសើមបន្តិច។
- ច្រកដើមរុក្ខជាតិចូលថង់ A រួចបក់យកខ្យល់ពីបរិយាកាសឱ្យពេញ រួចចងឱ្យជិត។
- យកថង់ B (ថង់ 2 Kg) បក់យកខ្យល់ពីបរិយាកាសឱ្យពេញ រួចចងឱ្យជិត។
- យកឡាំងគ្របពីលើថង់ទាំងពីរ ទុកក្នុងទីងងឹតចំនួន ១យប់។
- បូមទឹកកំបោរថ្លាបញ្ចូលថង់ a និង b (ថង់ 200g)
- ផ្ទេរខ្យល់ពីថង់ A ចូលទៅក្នុងថង់ a ដោយគ្រវីថង់ a ថ្មីមៗ ដើម្បីឱ្យឧស្ម័នរលាយចូលក្នុងទឹកកំបោរ។
- ផ្ទេរខ្យល់ពីថង់ B ចូលទៅក្នុងថង់ b ដោយគ្រវីថង់ b ថ្មីមៗ ដើម្បីឱ្យឧស្ម័នរលាយចូលក្នុងទឹកកំបោរ។
- សង្កេតលទ្ធផលនៃថង់ a និង b។



6. វិភាគលទ្ធផល

	ថង់ A (a)	ថង់ B (b)
វត្តមាន CO ₂		
ស្ថានភាពទឹកកំបោរ		

.....

7. សន្និដ្ឋាន

.....

សំណួរត្រិះរិះ

១) តើឧស្ម័ន CO₂ ដែលបញ្ចេញដោយរុក្ខជាតិផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់បម្រែបម្រួលបរិយាកាស ដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

.....

២) តើរុក្ខជាតិធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃឧស្ម័ន CO₂ ដូចម្តេច? ចូរពន្យល់។

.....

ជំពូក្រាម ៣ ៖ មេរៀនពិសោធន៍ទី១២

៣.១. មេរៀនពិសោធន៍ទី១

បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអាល់ប៊ុយមីនក្នុងសសិត

ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតពីអត្តសញ្ញាណអាល់ប៊ុយមីនក្នុងសសិត។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ប្រូតេអ៊ីនជាម៉ូលេគុលសំបាប់បង្កឡើងដោយអាស៊ីតអាមីណូជាច្រើន។ ប្រូតេអ៊ីនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់ការវរស់ដោយវាបង្កើតជាសមាសធាតុរបស់កោសិកា ព្រមទាំងដើរតួនាទីជាអង់ស៊ីម អរម៉ូន អង់ទីករ និងទ្រទ្រង់ចលនាមេកានិករបស់សារពាង្គកាយ។ ធាតុបង្ករបស់ម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនរួមមានកាបូន អុកស៊ីសែន អ៊ីដ្រូសែន កាបូន ស្ថាន់ដ័រ ផូស្វាត និងអាសូត។ ប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងអាហារដូចជា សាច់ ស៊ុត បន្លែ ត្រី និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាដើម។ នៅក្នុងស៊ុតបក្សីប្រូតេអ៊ីនសម្បូរនៅក្នុងផ្នែកសសិតដែលវាជាសារធាតុនៅព័ទ្ធជុំវិញល្បឿងស៊ុត។ ប្រូតេអ៊ីនអាចបាត់បង់គុណភាពដោយសារកត្តាមួយចំនួនដូចជាអាស៊ីតប្រូធាសខ្លាំង អង្គធាតុរំលាយ សាប៊ូ កំហាប់អំបិលលោហៈ ធាតុធ្ងន់ បម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព ចលនាមេកានិក និងកត្តាផ្សេងៗទៀត។

3. ណែនាំដំណើរការពិសោធន៍

បម្រុងប្រយ័ត្ន
ត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះសារធាតុគីមីដូចជាសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតជាសារធាតុមួយមានគ្រោះថ្នាក់ងាយឆាបឆេះ បើស្រក់លើស្បែក ឬខោអាវត្រូវលាងជម្រះជាមួយទឹកជាបន្ទាន់។



ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់គ្រូ

ប្រធានបទ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអាល់ប៊ុយមីនក្នុងសសិត

1. វត្ថុបំណង

បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអាល់ប៊ុយមីនក្នុងសសិត។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ប្រូតេអ៊ីនជាម៉ូលេគុលសំបាប់បង្កឡើងដោយអាស៊ីតអាមីណូជាច្រើន។ ប្រូតេអ៊ីនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់ការវរស់ដោយវាបង្កើតជាសមាសធាតុរបស់កោសិកា ព្រមទាំងដើរតួនាទីជាអង់ស៊ីម អរម៉ូន អង់ទីករ និងទ្រទ្រង់ចលនាមេកានិករបស់សារពាង្គកាយ។ ធាតុបង្ករបស់ម៉ូលេគុល

ប្រូតេអ៊ីនរួមមានកាបូន អុកស៊ីសែន អ៊ីដ្រូសែន កាបូន ស្ថាន់ដឺរ ផូស្វាត និងអាសូត។ ប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងអាហារដូចជា សាច់ ស៊ុត បន្លែ ត្រី និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាដើម។ នៅក្នុងស៊ុតបក្សីប្រូតេអ៊ីនសម្បូរនៅក្នុងផ្នែកសស៊ុតដែលវាជាសារធាតុនៅព័ទ្ធជុំវិញលឿងស៊ុត។ ប្រូតេអ៊ីនអាចបាត់បង់គុណភាពដោយសារកត្តាមួយចំនួនដូចជាអាស៊ីតឬបាសខ្លាំង អង្គធាតុរំលាយ សាប៊ូ កំហាប់អំបិលលោហៈ ធាតុធ្ងន់ បម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព ចលនាមេកានិក និងកត្តាផ្សេងៗទៀត។

3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើគេអាចធ្វើអត្តសញ្ញាណអាស់ប៊ុយមីននៅក្នុងសស៊ុតបានយ៉ាងដូចម្តេច ?

៣.២ សម្មតិកម្ម

ចូរសង្កេតរូបខាងក្រោមរួចបំពេញតារាងព្យាករណ៍អំពីលក្ខណៈពណ៌របស់សូលុយស្យុងនៅក្នុងកែវនីមួយៗ។



	លក្ខណៈពណ៌			
	កែវទី១	កែវទី២	កែវទី៣	កែវទី៤
ការសង្កេតទី១
ការសង្កេតទី២

៣.៣ ដំណើរការ

សម្ភារ

ទង់ដែងស៊ុលផាត ($CuSO_4$) 0.5% សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត ($NaOH$) 10% ស៊ុតមាន់ឬស៊ុតទា កែវជ័រថ្លា កែវទឹក ឬបានគោម ពីប៉ែត ក្រដាសបោះពុម្ពសន្លឹក ស៊ីឡាំងក្រិត ដើងទម្រ ក្រដាសជូតមាត់ (រូប 3.1)។



រូប 3.1 សម្ភារពិសោធន៍អំពីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអាស់ប៊ុយមីនក្នុងសស៊ុត

ដំណើរការ

- គោះស៊ុតមាន់ ឬស៊ុតទា ហើយញែកផ្នែកស៊ុត និងផ្នែកលឿងស៊ុតដាច់ចេញពីគ្នាដោយដោយ ថ្នមៗ រួចយកស៊ុតដាក់ចូលក្នុងកែវ។
- ចាក់ទឹក 100ml ចូលទៅក្នុងកែវស៊ុតថ្នមៗកុំអោយបែកស៊ុត(ចាក់ទឹកឱ្យត្រូវនឹងមាត់កែវ ឬ កែមនៃកែវថ្នមៗ) រួចធ្វើការកូរថ្នមៗរយៈពេលមួយនាទីកន្លះ បន្ទាប់មកយកល្អាយនោះមក ច្រោះ (ត្រូវរងចាំមួយសន្ទុះរហូតដល់វាលែងស្រក់)។
- បូមសូលុយស្យុងដែលបានច្រោះរួចចំនួន 3 ml (សូលុយស្យុងអាល់ប៊ុយមីន) ដាក់ចូលក្នុងកែវ ទី1 ទី2 និងទី3។
- ដាក់សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត 10% ចំនួន 15-18 តំណក់ទៅក្នុងកែវជីវីទី1 និងទី2 ឯកែវទី4 ដាក់ចំនួន 1.5 ml (ឬ ២៥ ដំណក់)។
- ក្រឡុកអោយសព្វរួចធ្វើការសង្កេតលើកទី១។
- ដាក់ទង់ដែងស៊ុលផាត 0.5% ចំនួន 15-18 តំណក់ទៅក្នុងកែវទី1 ទី3 ឯទី4 ដាក់ចំនួន 1.5 ml រួចធ្វើការក្រឡុកម្តងទៀតឱ្យសព្វ (រួចធ្វើការសង្កេតលើកទី២)។

៣.៤ លទ្ធផលពិសោធន៍

តារាង 3. 1 លក្ខណៈពណ៌របស់សូលុយស្យុងនៅក្នុងបំពង់សាកនីមួយៗ។

	លក្ខណៈពណ៌			
	កែវជីវីទី១	កែវជីវីទី២	កែវជីវីទី៣	កែវជីវីទី៤
ការសង្កេតទី១	ពណ៌សមានកករ	ពណ៌សថ្លា	ពណ៌សថ្លា	ពណ៌សថ្លា
ការសង្កេតទី២	ពណ៌ស្វាយចាស់	ពណ៌សថ្លា	ពណ៌ទឹកសណ្តែក	ពណ៌ទឹកសមុទ្រ



រូប 3. 2 លទ្ធផលពិសោធន៍អំពីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអាល់ប៊ុយមីនក្នុងស៊ុត

លទ្ធផលការសង្កេតពិសោធន៍ទី១បង្ហាញថាសូលុយស្យុងក្នុងកែវទី១មានពណ៌សនិងមានកករ កែវទី១ ទី២ និងកែវទី៤មានពណ៌សថ្លា។ ប៉ុន្តែការសង្កេតលើកទី២បានបង្ហាញថាសូលុយស្យុងនៅក្នុង កែវទី១ប្រែជាពណ៌ស្វាយចាស់ កែវទី២នៅពណ៌សថ្លាដដែល កែវទី៣ប្រែជាពណ៌ទឹកសណ្តែក និង កែវទី៣ប្រែពណ៌ទឹកសមុទ្រ។ ពណ៌សូលុយស្យុងនៅក្នុងកែវទី២ ទី៣ និងកែវទី៤មិនអាចឱ្យយើងបញ្ជាក់ ពីអត្តសញ្ញាណអាល់ប៊ុយមីនរបស់ស៊ុតបានទេ (តារាង 3.1)។ ដូច្នេះមានតែពណ៌ស្វាយរបស់សូលុយ ស្យុងកែវទី១ទេដែលអាចបញ្ជាក់បានពីអត្តសញ្ញាណអាល់ប៊ុយមីននៅក្នុងស៊ុត។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

ផ្អែកលើលទ្ធផលពិសោធន៍នេះ យើងសន្និដ្ឋានបានថាអត្តសញ្ញាណអាល់ប៊ុយមីនពិតជាមាន ទម្រង់ខាប់ដែលកើតពីការចងសម្ព័ន្ធប្រាក់ប៊ុបទីតរបស់ប្រូតេអ៊ីនក្នុងសស៊ុតពិតប្រាកដមែន សម្មតិកម្ម ខាងលើត្រូវបានគាំទ្រ ឬប្រានចោលដោយលទ្ធផលនៃការពិសោធនេះ។

សំណួរត្រិះរិះ

១) គេប្រើសូលុយស្យុង 10% នៃ NaOH និងសូលុយស្យុង 0.5% នៃ CuSO4 ដើម្បីអ្វី?

គេប្រើសូលុយស្យុង 10% នៃ NaOH ដើម្បីផ្តាច់សម្ព័ន្ធប៊ុបទីត ឬចំណងប៊ុបទីតដែលមានមាន នាទីចងក្លាប់អាស៊ីតអាមីនេពីមួយទៅមួយក្នុងការបង្កើតបានជាម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ហើយគេប្រើសូ លុយស្យុង 0.5% នៃ CuSO4 ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានប្រូតេអ៊ីន។

២) នៅក្នុងសូលុយស្យុងប្រូតេអ៊ីន តើ NaOH និង CuSO4 មានលក្ខណៈ និងសកម្មភាពដូច ម្តេច?

នៅក្នុងសូលុយស្យុងប្រូតេអ៊ីន NaOH និង CuSO4 មានលក្ខណៈ និងសកម្មភាពជាអាល់កា ឡាំង។ វាបានចងសម្ព័ន្ធកុំផ្លិចរវាងប្រាក់ប៊ុបទីតរបស់ប្រូតេអ៊ីនជាមួយអ៊ីយ៉ុងទង់ដែងរបស់អំបិល ទង់ដែងស៊ុលផាត (តាមចំណងប៊ុបទីត) បង្កើតបានជាពណ៌កុំផ្លិចមួយគឺពណ៌ស្វាយ ដែលអាចឱ្យ យើងងាយក្នុងការសង្កេត ពេលមានប្រតិកម្មកើតឡើង។

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្និកមិច្ចការពិសោធន៍របស់សិស្ស

ប្រធានបទ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអាល់ប៊ុយមីនក្នុងសស៊ុត

1. វត្ថុបំណង

ប្រូតេអ៊ីនជាម៉ូលេគុលសំបាប់បង្កឡើងដោយអាស៊ីតអាមីនេជាច្រើន។ ប្រូតេអ៊ីនដើរតួរយ៉ាង សំខាន់នៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់ការវិវឌ្ឍដោយវាបង្កើតជាសមាសធាតុរបស់កោសិកា ព្រមទាំងដើរតួ រជាអង់ស៊ីម អរម៉ូន អង់ទីករ និងទ្រទ្រង់ចលនាមេកានិករបស់សារពាង្គកាយ។ ធាតុបង្ករបស់ម៉ូលេ គុលប្រូតេអ៊ីនរួមមានកាបូន អុកស៊ីសែន អ៊ីដ្រូសែន កាបូន ស្ថាន់ជីវ ផូស្វាត និងអាសូត។ ប្រូតេអ៊ីនត្រូវ បានរកឃើញនៅក្នុងអាហារដូចជា សាច់ ស៊ុត បន្លែ ត្រី និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាដើម។ នៅក្នុងស៊ុតបក្សីប្រូ តេអ៊ីនសម្បូរនៅក្នុងផ្នែកសស៊ុតដែលវាជាសារធាតុនៅព័ទ្ធជុំវិញលឿងស៊ុត។ ប្រូតេអ៊ីនអាចបាត់បង់ គុណភាពដោយសារកត្តាមួយចំនួនដូចជាអាស៊ីតឬបាសខ្លាំង អង្គធាតុរំលាយ សាប៊ូ កំហាប់អំបិល លោហៈធាតុធ្ងន់ បម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព ចលនាមេកានិក និងកត្តាផ្សេងៗទៀត។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអាល់ប៊ុយមីនសស៊ុត។

3. សំណួរគន្លឹះ

4. សម្មតិកម្ម

	លក្ខណៈពណ៌			
	កែវជ័រទី១	កែវជ័រទី២	កែវជ័រទី៣	កែវជ័រទី៤
ការសង្កេតទី១
ការសង្កេតទី២

5. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារៈ ទង់ដែងស៊ុលផាត (CuSO_4) 0.5%
 សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត (NaOH) 10% ស៊ីតមាន់ ឬស៊ីត
 ទា កែវជ័រថ្លា កែវទឹកឬបានគោម ពីប៉ែត ក្រដាសប្រោះ១
 សន្លឹក ស៊ីឡាំងក្រិត ជើងទម្រ ក្រដាសជូតមាត់។



ដំណើរការ

- គោះស៊ីតមាន់ ឬស៊ីតទា ហើយញែកផ្នែកសស៊ីត និងផ្នែកល្បឿងស៊ីតដាច់ចេញពីគ្នា ដោយដោយថ្នមៗ រួចយកសស៊ីតដាក់ចូលក្នុងកែវ។
- ចាក់ទឹក 100 ml ចូលទៅក្នុងកែវស៊ីតថ្នមៗកុំអោយបែកសស៊ីត (ចាក់ទឹកឱ្យត្រូវនឹង មាត់កែវ ឬតែមនៃកែវថ្នមៗ) រួចធ្វើកូរថ្នមៗរយៈពេលមួយនាទីកន្លះ បន្ទាប់មកយក ល្បាយនោះមកប្រោះ (ត្រូវរង់ចាំមួយសន្ទុះរហូតដល់វាលែងស្រក់)។
- បូមសូលុយស្យុងដែលបានប្រោះរួចចំនួន 3 ml (សូលុយស្យុងអាល់ប៊ុយមីន) ដាក់ចូល ក្នុងកែវ ទី១ ទី២ និងទី៣។
- ដាក់សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត 10% ចំនួន 15-18 តំណក់ទៅក្នុងកែវជ័រទី១ និងទី២ ឯកែវទី ៤ ដាក់ចំនួន 1.5 ml (ឬ ២៥ តំណក់) ។
- ក្រឡុកអោយសព្វរួចសង្កេតលើកទី១។
- ដាក់ទង់ដែងស៊ុលផាត 0.5% ចំនួន 15-18 តំណក់ទៅក្នុងកែវទី១ ទី៣ ហើយទី៤ ដាក់ ចំនួន 1.5 ml រួចក្រឡុកម្តងទៀតឱ្យសព្វ (រួចសង្កេតលើកទី២)។



6. វិភាគលទ្ធផល

ចូរបំពេញលទ្ធផលក្នុងតារាងខាងក្រោមអំពីលក្ខណៈពណ៌របស់សូលុយស្យុងក្នុងកែវ ទាំង៤។

	លក្ខណៈពណ៌			
	កែវជ័រទី១	កែវជ័រទី២	កែវជ័រទី៣	កែវជ័រទី៤
ការសង្កេតទី១
ការសង្កេតទី២

.....

7. សន្និដ្ឋាន

.....

.....

សំណួរត្រិះរិះ

១) តើគេប្រើសូលុយស្យុង 10% នៃ NaOH និងសូលុយស្យុង 0.5% នៃ CuSO₄ ដើម្បីអ្វី?

.....

.....

២) នៅក្នុងសូលុយស្យុងប្រូតេអ៊ីន តើ NaOH និង CuSO₄ មានលក្ខណៈ និងសកម្មភាពដូចម្តេច?

.....

.....

៣.២.មេរៀនពិសោធន៍២

វិធីផ្គិតស្នាមផូស៊ីល

ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

ផលិតពុម្ពក្នុង និងពុម្ពក្រៅរបស់សារពាង្គកាយមួយតំណាងឱ្យផូស៊ីល។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន


ផូស៊ីលជាស្លាកស្នាមសំណល់សាកសពរបស់សត្វ ឬរុក្ខជាតិ ដែលកប់នៅក្នុងស្រទាប់ផែនឬនៅក្នុងស្រទាប់សិលាក្នុងរយៈពេលដ៏យូរ។ ផូស៊ីលទាំងអស់អាចជាផ្តិត គម្របសារពាង្គកាយ ដូចជាសំបកសិប្បិសត្វ ឬស្លាកស្នាមផ្សេងៗនៃការរស់។ ផ្នែករឹងនៃសារពាង្គកាយ ដែលបានកប់នៅក្នុងកម្ទេចកំណ ហើយរលាយបន្តិចម្តងៗបន្ទាល់ទុកនូវពុម្ពទេមានទម្រង់ដូចសារពាង្គកាយ ហៅថាពុម្ពក្រៅ។ ចំណែកឯកម្ទេចកំណដែលបានហូរចូលមកបំពេញពុម្ពទេនោះ មានទ្រង់ទ្រាយដូចជាសារពាង្គកាយ ហើយកម្ទេចកំណនោះនឹងក្លាយជាសិលាហៅថាពុម្ពក្នុង។

3. ណែនាំដំណើរការពិសោធន៍

លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើដី ឥដ្ឋសម្រាប់ក្មេងលេងដែលមាន លក់នៅតាមបណ្ណាគារជំនួសដី ឥធម្មតាបាន។


នៅតាមសាលាខ្លះ ម្ចាស់សិលាមានការលំបាកក្នុង ការស្វែងរក។

៥. ដំណើរការពិសោធន៍
ឈ្មោះ: ដីឥដ្ឋ ដីឥដ្ឋប្រៃ ម្ចាស់សិលា បន្ទះក្រដាស ចានក្រដាស ប្លង់ ទឹកស្អាតស្រីសត្វ។



៦. ដំណើរការពិសោធន៍

- លាយដីឥដ្ឋជាមួយទឹកក្នុងដំបៅដោយសម្របបរិយាកាសក្នុងប្លង់ដីឥដ្ឋប្រៃ បន្ទាប់មកយក ប្លង់មកលាយលើដីឥដ្ឋប្រៃ។
- យកស្រទាប់ស្រីសត្វ មកលាយប្រៃ ហើយយកទៅចាក់លើដី ឥដ្ឋប្រៃស្រទាប់ស្រីសត្វទុកទុកទុកទុកទុក (ដូចយក)។
- ចាប់ផ្តើមយកចេញមកចាប់សំណាកចេញពីដីឥដ្ឋប្រៃ ចូលប្រយ័ត្ន។
- រាយប្លង់សិលាជាមួយទឹកប្រិទ្ធ ហើយប្រចាំថ្ងៃលេចចេញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្លង់។ ចាក់ម្ចាស់សិលាក្នុងដីឥដ្ឋ ចុងម្ចាស់សិលាក្នុងដីឥដ្ឋ (ដូចយក) រក្សាទុកយោងយ ចូលយប់ដើម្បីឱ្យម្ចាស់សិលាស្ងួត។
- រៀបរយដើម្បីកាត់ស្រទាប់ស្រីសត្វចេញពីម្ចាស់សិលា។
- ដើម្បីការប្រមូលម្ចាស់សិលា ដែលទទួលបាន ទិញក្រដាសប្លង់ ប្លង់ស្រីសត្វ ក្រដាសសំណាកស្រីសត្វ ក្រដាសសំណាកស្រីសត្វ ក្រដាសសំណាកស្រីសត្វ។



ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់គ្រូ

ប្រធានបទ វិធីផ្តិតស្នាមផ្លុស៊ីល

1. វត្ថុបំណង

ផលិតពុម្ពក្នុង និងពុម្ពក្រៅរបស់សារពាង្គកាយមួយតំណាងឱ្យផ្លុស៊ីល។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ផ្លុស៊ីលជាស្លាកស្នាមសំណល់សាកសពរបស់សត្វ ឬរុក្ខជាតិ ដែលកប់នៅក្នុងស្រទាប់ផែនឬនៅ ក្នុងស្រទាប់សិលាក្នុងរយៈពេលដ៏យូរ។ ផ្លុស៊ីលទាំងអស់អាចជាផ្លុស៊ីល គម្របសារពាង្គកាយ ដូចជាសំបក សិប្បិសត្វ ឬស្លាកស្នាមផ្សេងៗនៃការវិវត្ត។ ផ្នែករឹងនៃសារពាង្គកាយ ដែលបានកប់នៅក្នុងកម្ទេច កំណ ហើយរលាយបន្តិចម្តងៗបន្ទាប់ទុកនូវពុម្ពទេមានទម្រង់ដូចសារពាង្គកាយ ហៅថាពុម្ពក្រៅ ។ ចំណែកឯកម្ទេចកំណដែលបានហូរចូលមកបំពេញពុម្ពទេនោះ មានទ្រង់ទ្រាយដូចជាសារពាង្គកាយ ហើយកម្ទេចកំណនោះនឹងក្លាយជាសិលាហៅថាពុម្ពក្នុង (រូប 3.3)⁸។



រូប 3.3 ឧទាហរណ៍ខ្លះនៃប្រភេទផ្លុស៊ីល

⁸ <https://cambodiaexpatsonline.com/cambodian-culture-and-language/marine-fossils-found-mondulkiri-t38293.html>.

3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរកន្លឹះ

តើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតបានជាកំរុំពុម្ពក្នុង និងពុម្ពក្រៅនៃស្នាមផ្លុំស៊ីលរបស់ការរស់មួយ?

៣.២ សម្មតិកម្ម


តើវាកើតឡើងដូចម្តេច?

.....

.....

.....

.....



រូប 3.4 គំនិតនៃការយល់ឃើញពីរបៀបនៃការកើតផ្លុំស៊ីល

៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

ដីឥដ្ឋ ដង្កៀប ម្តាងសិលា បន្ទះក្តារឈើ បានញាស្ទិច ប្រេង


ទឹក សំបកសិប្បីសត្វ។



រូប 3.5 សម្ភារសម្រាប់ផលិតផ្លុំស៊ីល

ដំណើរការ

- លាយដីឥដ្ឋជាមួយទឹកក្នុងបរិមាណសមស្រប ហើយយកវាមកពង្រាបនៅលើបន្ទះក្តារឈើ បន្ទាប់មកយកប្រេងមកលាបលើដីឥដ្ឋនោះ



រូប3.6 ដំណើរការផលិតសំណាកពុម្ព (ក) ពុម្ពក្នុង និង(ខ) ពុម្ពក្រៅ

- យកសំបកសិប្បីសត្វ មកលាបប្រេង ហើយយកវាទៅដាក់លើដីឥដ្ឋរួចសង្កត់វាថ្មមៗចូលទៅក្នុងដីឥដ្ឋ(រូប 3.6 ក)^៩
 - បន្ទាប់មកយកដង្កៀបមកចាប់សំណាកនោះចេញពីដីឥដ្ឋដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
 - លាយម្តងសិលាជាមួយទឹកបន្តិច ហើយច្របាច់វាឱ្យសព្វលុះរហូតក្លាយជាម៉្យាងខាប់មួយ។ ចាក់ម្តង សិលាចូលទៅក្នុងដីឥដ្ឋត្រង់ពុម្ពរបស់សំណាកសិប្បីសត្វ (រូប3.6 ខ) រក្សាទុករយៈពេលមួយយប់ដើម្បីឱ្យម្តងសិលាស្ងួតល្អ។
 - ថ្ងៃបន្ទាប់យើងធ្វើការកោសដីឥដ្ឋចេញថ្មមៗពីម្តងសិលា
 - ធ្វើការប្រមូលពុម្ពគំរូម្តងសិលាដែលទទួលបាន និងវត្ថុដែលប្រើប្រាស់ធ្វើពុម្ពគំរូ ព្រមទាំងសំណាកសិប្បីសត្វ គ្រប់ក្រុមរបស់សិស្សដាក់លាយឡំគ្នាលើតុមួយ។
 - រួចឱ្យសិស្សតាមក្រុមមកធ្វើការផ្គូផ្គងសំណាករបស់ខ្លួនទៅនឹងសម្ភារពុម្ពគំរូដែលមាននៅលើតុ
 - បន្ទាប់មកឱ្យសិស្សធ្វើការពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផល និងឆ្លើយសំណួរ។
- ៣.៤ វិភាគលទ្ធផល



សំណាកសិប្បីសត្វ ពុម្ពគំរូសំណាកសិប្បីសត្វ

រូប 3.7 លទ្ធផលនៃការផលិតផ្លុស៊ីលរបស់ងារ

លទ្ធផលបានបង្ហាញថាពុម្ពដែលកើតពីការសង្កត់ងារចូលទៅក្នុងដីឥដ្ឋបានផ្តិតនូវស្លាកស្នាម និងទម្រង់ទាំងមូលរបស់ងារ។ ការសង្កត់ងារចូលទៅក្នុងដីឥដ្ឋនេះជាដំណើរការនៃការកើតនូវពុម្ពក្រៅរបស់ការវែកនៅក្នុងសិលាស្រទាប់ផែនដី។ ការចាក់ចូលនូវម្តងសិលាចូលទៅក្នុងស្នាមងារនៅលើដីឥដ្ឋបង្កើតបានជាសំណាកសត្វងារមួយដែលមានលក្ខណៈ និងទម្រង់ដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងងារដែលយើងបានផ្តិតស្នាមចេញពីពុម្ពក្រៅនៅលើដីឥដ្ឋ។ ងារដែលផ្តិតបាននេះតាងឱ្យសាកសពសារពាង្គកាយការវែកមួយដែលបានងាប់នៅលើផែនដីអស់រយៈពេលយូរ ហើយស្លាកស្នាមរបស់ងារនៅលើដីឥដ្ឋតាងឱ្យស្នាមផ្លុស៊ីលដែលកប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងស្រទាប់សិលានៃកម្រិតផែនដី (រូប 3.7)។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

ផ្លុស៊ីលជាស្លាកស្នាម ឬសំណល់របស់ការវែកជំនាន់ដើម ដែលបន្សល់ទុកនៅក្នុងថ្មជាយូរលង់ណាស់មកហើយ។ ភាគច្រើននៃផ្លុស៊ីលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសិលាកំទេចកំណា។ ពុម្ពក្រៅកើតឡើង

^៩ សៀវភៅសិក្សាគោលដីវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ទំព័រទី ២១៩។

ដោយយកសំណាកសិប្បិសត្វមកផ្ដិតឱ្យមានស្នាមលើដីឥដ្ឋ ឯពុម្ពក្នុងកើតឡើងដោយការយក ម្ដងសិលាមកចាក់បំពេញលើពុម្ពក្រៅ ដែលបង្កើតបានជាពុម្ពក្នុងនៃសំណាកនោះ។

សំណួរត្រិះរិះ

១) តើពុម្ពក្រៅ និងពុម្ពក្នុងកើតឡើងដូចម្ដេច ?

- នៅពេលការវែសមួយបានងាប់ សាកសពក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងបាតបឹង ឬបាតសមុទ្រ បន្ទាប់មកកំទេចកំណបានហូរតាមទឹកធ្លាក់មកគ្របដណ្ដប់លើសាកសព។ សាកសពរលួយបន្តិចម្ដងៗហើយ បន្ទាល់ទុកតែពុម្ពទេ ដែលមានរូបរាងដូចការវែសនោះ (ការកកើតពុម្ពក្រៅ)
- ការកកើតពុម្ពក្នុងគឺនៅពេលកំទេចកំណធ្លាក់មកបំពេញពុម្ពក្រៅពេលនោះវាក៏បង្កើតបានពុម្ពក្នុង។

២) នៅក្នុងពិសោធនេះ តើដីឥដ្ឋ និងម្ដងសិលាតំណាងឱ្យអ្វី ?

- ដីឥដ្ឋ និងម្ដងសិលាតំណាងឱ្យកម្ទេចកំណ ដែលបង្កើតបានជាពុម្ពក្នុង និងពុម្ពក្រៅ។

៣) ជាទូទៅ តើគេអាចរកឃើញផ្លូវស៊ីលរបស់ការវែសនៅទីណា ?

- ជាទូទៅភាគច្រើននៃផ្លូវស៊ីលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសិលាកម្ទេចកំណ។

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ វិធីផ្គិតស្នាមផ្លូវស៊ីល

1. វត្ថុបំណង

ផលិតពុម្ពក្នុង និងពុម្ពក្រៅរបស់សារពាង្គកាយមួយតំណាងឱ្យផ្លូវស៊ីល។

2. សំណួរគន្លឹះ

.....

3. សម្មតិកម្ម

តើវាកើតឡើងដូចម្ដេច?

.....

.....


.....

.....



4. ដំណើរការពិសោធន៍

- លាយដីឥដ្ឋជាមួយទឹកក្នុងបរិមាណសមស្របហើយយកវាមកពង្រាបនៅលើបន្ទះក្ដារឈើ បន្ទាប់មកយកប្រេងមកលាបលើដីឥដ្ឋនោះ។
- យកសំបកសិប្បិសត្វ មកលាបប្រេង ហើយយកវាទៅដាក់លើដីឥដ្ឋរួចសង្កត់វាថ្មមៗចូលទៅក្នុងដីឥដ្ឋ (ដូចរូប ក)។
- បន្ទាប់មកយកដង្ហៀបមកចាប់សំណាកនោះចេញពីដីឥដ្ឋដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។



- លាយម្ខាងសិលាជាមួយទឹកបន្តិច ហើយច្របាច់វាឱ្យសព្វលុះរហូតក្លាយជាម៉ៅខាប់មួយ។ ចាក់ម្ខាងសិលាចូលទៅក្នុងដីឥដ្ឋត្រង់ពុម្ពរបស់សំណាកសិប្បីសត្វ (ដូចរូបខ) រក្សាទុករយៈពេលមួយយប់ដើម្បីឱ្យម្ខាង សិលាស្ងួតល្អ។
- ថ្ងៃបន្ទាប់យើងធ្វើការកោសដីឥដ្ឋចេញថ្នមៗពីម្ខាងសិលា។
- ធ្វើការប្រមូលពុម្ពគំរូម្ខាងសិលា ដែលទទួលបាន និងវត្ថុដែលប្រើប្រាស់ធ្វើពុម្ពគម្រូ ព្រមទាំងសំណាក សិប្បីសត្វ គ្រប់ក្រុមរបស់សិស្សដាក់លាយឡំគ្នាលើតុមួយ។
- រួចឱ្យសិស្សតាមក្រុមមកធ្វើការផ្គុំផ្គង់សំណាករបស់ខ្លួនទៅនឹងសម្ភារៈពុម្ពគម្រូដែលមាននៅលើតុ។
- បន្ទាប់មកឱ្យសិស្សធ្វើការពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផល និងឆ្លើយសំណួរ។

5. វិភាគលទ្ធផល

ចូរគូររូបពុម្ពក្រៅ និងពុម្ពក្នុង។

6. សន្និដ្ឋាន

សំណួរត្រិះរិះ

១) តើពុម្ពក្រៅ និងពុម្ពក្នុងករណីកើតឡើងដូចម្តេច?

.....

២) ក្នុងពិសោធន៍នេះ តើដីឥដ្ឋ និងម្ខាងសិលាតំណាងឱ្យអ្វី?

.....

៣) ជាទូទៅ តើគេអាចរកឃើញផ្លូវស៊ីលរបស់ការវាស់នៅទីណា?

.....

៣.៣. មេរៀនពិសោធន៍៣

សង្កេតស្នូម៉ាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិ

ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើការងារពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតទម្រង់ស្នូម៉ាតរបស់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងឌីកូទីលេដូន


វិភាគលើភាពខុសគ្នានៃចំនួនស្នូម៉ាតនៅផ្នែកខាងក្រោម និងផ្នែកខាងលើស្លឹករុក្ខជាតិគោក និងរុក្ខជាតិទឹក។

ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកអិច្វការពិសោធរបស់គ្រូ

ប្រធានបទ សង្កេតស្តាប់រូបស្លឹករុក្ខជាតិ

1. វត្ថុបំណង

- សង្កេតទម្រង់ស្តាប់រូបស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងឌីកូទីលេដូន។
- វិភាគលើភាពខុសគ្នានៃចំនួនស្តាប់នៅផ្នែកខាងក្រោម និងផ្នែកខាងលើស្លឹករុក្ខជាតិគោក និងរុក្ខជាតិទឹក។



រូប 3.8
ស្តាប់រុក្ខជាតិ¹⁰

រុក្ខជាតិ¹⁰

លក្ខណៈពិសេសនៃស្តាប់អាស្រ័យលើ

ប្រភេទរុក្ខជាតិ (A, B) ស្តាប់នៃរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន (C, D)ស្តាប់នៃរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន។ ស្តាប់គឺជាជំនាញសម្រាប់ការសិក្សា ជាទូទៅនៅក្នុងអេពីខែមស្លឹករុក្ខជាតិ និងបន្ទាត់រុក្ខជាតិ ហើយក៏មាននៅក្នុងអេពីខែមនៃផ្នែកដើមខ្លីៗ ឬមែកខ្លីៗផងដែរ។ កោសិកានីមួយៗនៃស្តាប់មានគ្រាប់រួមគ្នាក្នុងដំណើរបណ្តូរឧស្ម័ន CO₂ (ដំណើរស្ទីសំយោគ) និងបណ្តូរឧស្ម័ន O₂ ក្នុងដំណើរដង្ហើមកោសិកា រវាងរុក្ខជាតិនិងបរិយាកាសខាងក្រៅ ព្រមទាំងគ្រាប់រួមគ្នាក្នុងសរីរាង្គរុក្ខជាតិតាមរយៈការរំកាយចំហាយទឹក។

ជាទូទៅស្តាប់សំបូរនៅតែមនៃផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិផ្នែកខាងក្រោម។ វាផ្តុំឡើងពីកោសិកាល្បាតរាងដូចគ្រាប់សណ្តែកសៀង (ឬរាងដូចតម្រងនោមជ្រូក)

ចំនួនពីរផ្តុំគ្នាបង្កើតបានជារន្ធមួយ ដែលមាននាទីបណ្តូរឧស្ម័ន និងរំកាយចំហាយទឹករបស់រុក្ខជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ រុក្ខជាតិលិចក្នុងទឹក (ពពួក Submerged hydrophytes) មិនមានស្តាប់ទេ គឺវាមានបណ្តូរឧស្ម័នផ្ទាល់ក្នុងទឹក និងមានបន្ទាត់ខ្ពស់ក្នុងការរក្សាតុល្យភាពទឹកក្នុង និងក្រៅកោសិកា។

រូប 3.9 ចកកន្ទុយផ្តែ

¹⁰ <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00225>

3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើស្នូលស្នូលរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងឌីកូទីលេដូនមានរូបរាងខុសគ្នាដូចម្តេច? តើចំនួនស្នូលក្នុងអេពីខែមនៃផ្នែកខាងលើ និងផ្នែកខាងក្រោមស្លឹករុក្ខជាតិគោក និងរុក្ខជាតិទឹកខុសគ្នាដូចម្តេច?

៣.២ សម្មតិកម្ម

គួររូបស្នូលរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន គួររូបស្នូលរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន

ចំនួនស្នូល (គិតលើចំនួនច្រើន ឬតិច)	ផ្នែកខាងលើ	ផ្នែកខាងក្រោម
	ច្រើនឬតិច?	ច្រើនឬតិច?
អេពីខែមស្លឹករុក្ខជាតិគោក		
អេពីខែមស្លឹករុក្ខជាតិទឹក		


៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ «ពិនិត្យទម្រង់ស្នូល»

មីក្រូទស្សន៍ បន្ទះឡាម ស្កុតថ្នាំ ទឹកថ្នាំលាបក្រចកថ្នាំ (គ្មានពណ៌) ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន ស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន។

ដំណើរការ

- លាង និងដុតសម្អាតផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិឱ្យបានស្អាត និងស្អាតល្អ។
- លាបទឹកថ្នាំលាបក្រចកក្នុងបរិមាណស្តើងល្មមលើផ្ទៃខាងក្រោមនៃផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិទាំងពីរប្រភេទ រួចទុកឱ្យស្ងួត។
- បិទស្កុតថ្នាំលើផ្ទៃទឹកថ្នាំលាបក្រចកស្អាតនៃស្លឹកលើ (ប្រវែងខ្លីល្មម) រួចប្រើមេដៃពង្រាបលើស្កុតនោះថ្មីម្តង។
- បន្ទាប់មកបកស្កុតចេញពីស្លឹកលើនីមួយៗ មកបិទលើបន្ទះឡាមដោយដាក់ឈ្មោះសម្គាល់រុក្ខជាតិលើឡាមមែលផង។
- យកសំណាកស្នូលធ្វើរួច មកពិនិត្យតាមមីក្រូទស្សន៍ រួចគូររូបភាពស្នូលដែលបានឃើញក្នុងមីក្រូទស្សន៍។




រូប 3.10 វិធីពិនិត្យទម្រង់ស្នូល។

សម្ភារ «ពិនិត្យចំនួនស្នូលរុក្ខជាតិគោក និងរុក្ខជាតិទឹក»

មីក្រូទស្សន៍ បន្ទះឡាម ស្កុតថ្នាំ ទឹកថ្នាំលាបក្រចកថ្នាំ (គ្មានពណ៌) ស្លឹករុក្ខជាតិទឹក (ស្លឹកកំប្លោក) ស្លឹករុក្ខជាតិគោក (ស្លឹកស្វាយ ឬខ្នុរ...)

- ដំណើរការ
- លាង និងជូតសម្អាតផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិឱ្យបានស្អាត និងស្ងួតល្អ។
- លាបថ្នាំលាបក្រចកក្នុងបរិមាណស្តើងល្មមលើផ្ទៃខាងក្រោម និងខាងលើនៃផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិទាំងពីរប្រភេទ រួចទុកឱ្យស្ងួត។
- បិទស្កុតថ្នាំលើផ្ទៃទឹកថ្នាំលាបក្រចកដែលបានលាបស្ងួតនឹងស្លឹកឈើ (ប្រវែងខ្លីល្មមសម្រាប់បិទពីលើបន្ទះឡាម)។
- បន្ទាប់មកបកស្កុតចេញពីផ្ទៃខាងលើនិងខាងក្រោមស្លឹកឈើនីមួយៗរួចយកមកបិទលើបន្ទះឡាម ដោយដាក់ឈ្មោះសម្គាល់រុក្ខជាតិ ព្រមទាំងសម្គាល់អេពីខែមលើ និងក្រោម លើបន្ទះឡាមផង។
- យកសំណាកស្នូម៉ាតដែលបានធ្វើរួចមកពិនិត្យតាមមីក្រូទស្សន៍។
- រកចំនួនស្នូម៉ាតរួចវិភាគវិភាគលទ្ធផល (រូប 3.12)។




រូប 3.11 វិធីពិនិត្យទម្រង់ស្នូម៉ាត

៣.៤ (១) វិភាគលទ្ធផល

លទ្ធផល «ទម្រង់ស្នូម៉ាតរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងឌីកូទីលេដូន»

គូរស្នូម៉ាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន គូរស្នូម៉ាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន



រូប 3.13 ទម្រង់ស្នូម៉ាតរបស់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងឌីកូទីលេដូន

យោងតាមលទ្ធផលនៃការសង្កេតស្នូម៉ាត បង្ហាញថា ស្នូម៉ាតស្ថិតនៅក្នុងកោសិកាអេពីខែមរបស់ស្លឹកវាកើតឡើងពីកោសិកាល្បាតពីរ និងមានរន្ធចន្លោះកោសិកាល្បាតទាំងពីរ ប៉ុន្តែកោសិកាល្បាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនមានរូបរាងមូលទ្រវែងស្លូចកណ្តាល រីឯកោសិកាល្បាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន មានរូបរាងដូចគ្រាប់សណ្តែកសៀង ឬតម្រងនោមជ្រូក។ កោសិកាល្បាតទាំងពីរមានក្លរ៉ូប្លាស ។

៣.៥ (១) សន្និដ្ឋាន

ដូច្នោះ កោសិកាល្អាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនមានរាងមូលទ្រវែងស្នូចកណ្តាល រីឯ កោសិកាល្អាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន មានរាងដូចគ្រាប់សណ្តែកសៀង ឬតម្រងនោមជ្រូក។

៣.៤ (២) វិភាគលទ្ធផល

តារាង 3. 2 លទ្ធផលអំពីបរិមាណស្ករម៉ាតនៃអេពីខែមស្លឹករុក្ខជាតិ និងរុក្ខជាតិទឹក។

លទ្ធផល «ចំនួនស្ករម៉ាតរុក្ខជាតិគោក និង រុក្ខជាតិទឹក» ចំនួនស្ករម៉ាត (គិតលើ ចំនួនច្រើន ឬតិច)	ផ្ទៃខាងលើ	ផ្ទៃខាងក្រោម
	ច្រើនឬតិច?	ច្រើនឬតិច?
អេពីខែមស្លឹករុក្ខជាតិគោក	តិច	ច្រើន
អេពីខែមស្លឹករុក្ខជាតិទឹក	ច្រើន	តិច

សម្មតិកម្មដែលថា ស្ករម៉ាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិគោកផ្នែកខាងក្រោមមានចំនួនច្រើនជាងផ្នែកខាងលើ ប៉ុន្តែស្ករម៉ាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិទឹកផ្នែកខាងលើស្លឹកមានចំនួនស្ករម៉ាតច្រើនជាងត្រូវបានគាំទ្រដោយ លទ្ធផលពិសោធន៍នេះ។

៣.៥ (២) សន្និដ្ឋាន

ដូច្នោះ ចំនួនស្ករម៉ាតរបស់រុក្ខជាតិគោកផ្នែកខាងក្រោមផ្ទៃស្លឹកមានចំនួនច្រើនជាងផ្នែកខាងលើ ប៉ុន្តែរុក្ខជាតិទឹកមានចំនួនស្ករម៉ាតផ្នែកខាងលើផ្ទៃស្លឹកច្រើនជាងផ្នែកខាងក្រោមវិញ។

សំណួរត្រិះរិះ

១) តើប្អូនយល់ឃើញដូចម្តេច ចំពោះមូលហេតុនៃភាពខុសគ្នានៃចំនួនស្ករម៉ាតរុក្ខជាតិទឹក និងរុក្ខជាតិ គោកលើផ្ទៃស្លឹកទាំងសងខាង?

ចម្លើយ: ស្ករម៉ាតមាននាទីបណ្តុះឧស្ម័នរវាងបរិយាកាស ចំណែកស្លឹករុក្ខជាតិទឹកភាគច្រើនផ្ទៃ ខាងក្រោមស្លឹកប៉ះផ្ទាល់ជាមួយផ្ទៃទឹក ដូច្នោះ ផ្ទៃខាងក្រោមស្លឹករុក្ខជាតិទឹកមិនមានស្ករម៉ាតទេ(បើប៉ះ ផ្ទាល់ជាមួយទឹក) ឬមានចំនួនស្ករម៉ាតតិចតួច (បើមិនប៉ះផ្ទាល់ជាមួយទឹក) ។

២) តើការសិក្សាអំពីស្ករម៉ាតរបស់រុក្ខជាតិ ជួយឱ្យប្អូនយល់ពីសារប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអំពីរុក្ខជាតិ?

ចម្លើយ: (សិស្សឆ្លើយបានទូលំទូលាយ) ។

ផ្នែកទី៣ : សន្លឹកកិច្ចការពិសោធន៍របស់សិស្ស

ប្រធានបទ សង្កេតស្ករម៉ាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិ

1. វត្ថុបំណង

- សង្កេតទម្រង់ស្ករម៉ាតរបស់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងឌីកូទីលេដូន។
- វិភាគលើភាពខុសគ្នានៃចំនួនស្ករម៉ាតនៅផ្នែកខាងក្រោម និងផ្នែកខាងលើស្លឹករុក្ខជាតិ គោក និងរុក្ខជាតិទឹក។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

ស្ករម៉ាត គឺជាវចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាល្អាត ដែលជាទូទៅនៅក្នុងអេពីខែមស្លឹករុក្ខជាតិ និងបន្លាវរុក្ខ ជាតិ ហើយក៏មាននៅក្នុងអេពីខែមនៃផ្នែកដើមខ្លីៗឬមែកខ្លីផងដែរ។ កោសិកាល្អាតនីមួយៗនៃស្ករម៉ាត មាននាទីរួមគ្នាក្នុងដំណើរ បណ្តុះឧស្ម័ន CO₂ (ដំណើររស្មីសំយោគ) និងបណ្តុះឧស្ម័ន O₂ ក្នុងដំណើរ

ដង្ហើមកោសិកា រវាងរុក្ខជាតិនិងបរិយាកាសខាងក្រៅ ព្រមទាំងនាទីរក្សាតុល្យភាពទឹកក្នុងសរីរាង្គរុក្ខជាតិ តាមរយៈការរំកាយចំហាយទឹក។

ស្នូម៉ាតផ្ទុំឡើងពីកោសិកាល្អិតរាងដូចគ្រាប់សណ្តែកសៀង (ប្ររាងដូចតម្រងនោមជ្រូក) ដែលកោសិកាល្អិតទាំងពីរផ្ទុំគ្នាបង្កើតបានជារន្ធមួយមាននាទីបណ្តុះឧស្ម័ន និងរំកាយចំហាយទឹក របស់រុក្ខជាតិ។ ទន្ធមួយនេះ រុក្ខជាតិលិចក្នុងទឹក (ពពួក Submerged hydrophytes) មិនមានស្នូម៉ាតទេ គឺវាមានបណ្តុះឧស្ម័នផ្ទាល់ក្នុងទឹក និងមានបន្សាំខ្ពស់ក្នុងការរក្សាតុល្យភាពទឹកក្នុងនិងក្រៅ កោសិកា។

3. សំណួរគន្លឹះ

.....
.....

4. សម្មតិកម្ម

គូររូបស្នូម៉ាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនគូររូបស្នូម៉ាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន

ចំនួនស្នូម៉ាត (គិតលើចំនួនច្រើន ឬតិច)	ផ្ទៃខាងលើ	ផ្ទៃខាងក្រោម
	ច្រើនឬតិច?	ច្រើនឬតិច?
អេពីឌែមស្លឹករុក្ខជាតិគោក		
អេពីឌែមស្លឹករុក្ខជាតិទឹក		


5. ដំណើរការពិសោធ

សម្ភារ «ពិនិត្យទម្រង់ស្នូម៉ាត»

មីក្រូទស្សន៍ បន្ទះឡាម ស្កុតថ្លា ទឹកថ្នាំលាបក្រចកថ្លា(គ្មានពណ៌) ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន ស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន។

ដំណើរការ

- លាង និងជូតសម្ងាត់ផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិឱ្យបានស្អាត និងស្ងួតល្អ។
- លាបទឹកថ្នាំលាបក្រចកក្នុងបរិមាណស្តើងល្មមលើផ្ទៃខាងក្រោមនៃផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិទាំងពីរ ប្រភេទ រួចទុកឱ្យស្ងួត។
- បិទស្កុតថ្នាំលើផ្ទៃទឹកថ្នាំលាបក្រចកស្កុតនៃស្លឹកឈើ (ប្រវែងខ្លីល្មម) រួចប្រើមេដៃពង្រាបលើស្កុតនោះថ្មីៗ។
- បន្ទាប់មកបកស្កុតចេញពីស្លឹកឈើនីមួយៗ មកបិទលើបន្ទះឡាមដោយដាក់ឈ្មោះសម្គាល់រុក្ខជាតិលើឡាមែលផង។
- យកសំណាកស្នូម៉ាតធ្វើរួច មកពិនិត្យតាមមីក្រូទស្សន៍ រួចគូររូបភាពស្នូម៉ាតដែលបានឃើញក្នុងមីក្រូទស្សន៍។




សម្ភារ « ពិនិត្យចំនួនស្នូម៉ាតរុក្ខជាតិគោក និងរុក្ខជាតិទឹក »

មីក្រូទស្សន៍ បន្ទះឡាម ស្កុតថ្នាំ ទឹកថ្នាំលាបក្រចកថ្នាំ (គ្មានពណ៌) ស្លឹករុក្ខជាតិទឹក (ស្លឹកកំប្លោក) ស្លឹករុក្ខជាតិគោក (ស្លឹកស្វាយ ឬខ្នុរ...)

ដំណើរការ

- លាង និងជូតសម្ងាត់ផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិឱ្យបានស្អាត និងស្ងួតល្អ។
- លាបថ្នាំលាបក្រចកក្នុងបរិមាណស្តើងល្មមលើផ្ទៃខាងក្រោម និងខាងលើនៃផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិទាំងពីរប្រភេទ រួចទុកឱ្យស្ងួត។
- បិទស្កុតថ្នាំលើផ្ទៃទឹកថ្នាំលាបក្រចកដែលបានលាបស្កុតនឹងស្លឹកឈើ (ប្រវែងខ្លីល្មមសម្រាប់បិទលើបន្ទះឡាម)។
- បន្ទាប់មកបកស្កុតចេញពីផ្ទៃខាងលើ និងខាងក្រោមស្លឹកឈើនីមួយៗរួចយកមកបិទលើបន្ទះឡាម ដោយដាក់ឈ្មោះសម្គាល់រុក្ខជាតិ ព្រមទាំងសម្គាល់អេពីឌែមលើ និងក្រោមលើបន្ទះឡាមផង។
- យកសំណាកស្នូម៉ាតដែលបានធ្វើរួចមកពិនិត្យតាមមីក្រូទស្សន៍។
- រកចំនួនស្នូម៉ាតរូបវិភាគវិភាគលទ្ធផល។



6. វិភាគលទ្ធផល

លទ្ធផល « ទម្រង់ស្នូម៉ាតរុក្ខជាតិក្រោយពិនិត្យតាមមីក្រូទស្សន៍ »

គូររូបស្នូម៉ាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន គូររូបស្នូម៉ាតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន

.....

7. (១) សន្និដ្ឋាន

.....

លទ្ធផល « ចំនួនស្នូម៉ាតរុក្ខជាតិគោក និងរុក្ខជាតិទឹក »

ចំនួនស្នូម៉ាត (គិតលើចំនួនច្រើន ឬតិច)	ផ្ទៃខាងលើ	ផ្ទៃខាងក្រោម
	ច្រើនឬតិច?	ច្រើនឬតិច?
អេពីខែមស្លឹករុក្ខជាតិគោក		
អេពីខែមស្លឹករុក្ខជាតិទឹក		

7. (២) សន្និដ្ឋាន

.....

សំណួរត្រិះរិះ

១) តើប្អូនៗយល់ឃើញដូចម្តេច ចំពោះភាពខុសគ្នានៃស្នូម៉ាតនៃរុក្ខជាតិទឹក និងរុក្ខជាតិគោក ?

.....

២) តើការសិក្សាអំពីស្នូម៉ាតរបស់រុក្ខជាតិ ជួយឱ្យប្អូនៗយល់ពីសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអំពីរុក្ខជាតិ ?

.....

៣.៤.មេរៀនពិសោធន៍៤

អត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាស និងអង់ស៊ីមអាមីឡាស

ផ្នែកទី១ ៖ សេចក្តីណែនាំលើកិច្ចការពិសោធន៍

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាសក្នុងការ៉ុត និងថ្លើមសត្វ។

សង្កេតអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមអាមីឡាស។


2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

អង់ស៊ីម គឺជាភាពលើសពីដំណើរការប្រតិបត្តិការជីវិត ហើយមានប្រតិបត្តិការជាប្រភេទ។ គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងសរសៃឈាម មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ ប្រសិនបើគ្មានអង់ស៊ីម។ អង់ស៊ីមទាំងអស់សុទ្ធតែជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដើម្បីបំបែកស៊ុបស្ត្រានដោយមានមូលដ្ឋានមួយនៃវិទ្យាអង់ស៊ីមមួយមានដំណើរការលើស៊ុបស្ត្រាតមួយប្រយោគ។

អង់ស៊ីមមាននៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើង ដូចជាអង់ស៊ីមកាតាឡាសេនដែលមាននៅក្នុងក្រហមស្បែកជាដើម មានទីបំបែកផ្លុយត្រូស្ត្រូនដែលជាផលិតផលមកពីប្រតិបត្តិការសរសៃឈាម ដើម្បីការពារសរសៃឈាមពីការខូចខាតរបស់ប្រូតេអ៊ីនសរសៃឈាម។ រីឯ អង់ស៊ីមអេម៉ូឡីន ដែលជាអ្នកកាត់កាត់ និងលើកលែងហើរកែវកម្រិតមេឡានីនដែលមាននៅក្នុងស្បែក ក្នុងគ្រាប់ (កូទីណូស៊ីតរបស់គ្រាប់) និងមីម៉ាតាំង មានទីបំបែកនៅក្នុងសរសៃឈាម ។ សរុបមក ដែលមានស្ថិតនៅក្នុងសរសៃឈាមប្រើប្រាស់ជាប្រភពជាមធ្យម (គ្រាប់) ។ ក្រៅពីនេះ វាមាននៅក្នុងអង់ស៊ីមសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសរសៃឈាមផងដែរ ។

អង់ស៊ីមមានដំណើរការល្អបំផុតនៅសីតុណ្ហភាព 37°C ។ ការលំអិតស្ថិតនៅក្នុងសរសៃឈាម អង់ស៊ីមខឹងបាត់បង់សកម្មភាព គឺដូចគ្នាដល់អង់ស៊ីមដែលមាននៅក្នុងសរសៃឈាម ។ កំហាប់អង់ស៊ីមមានទទឹងលើស្បែកប្រតិបត្តិការ ការលំអិតកំហាប់ស៊ុបស្ត្រាត ឬកំហាប់អង់ស៊ីមកាន់តែខ្ពស់នឹងប្រតិបត្តិការកាន់តែលឿនឡើង។ ពេលខ្លះអង់ស៊ីមក្រៅក្រុមអង់ស៊ីមដែលមានលើសពីការមិន ឬដំណើរការ ដើម្បីជួយក្នុងប្រតិបត្តិការជីវិត ។

ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានជាខ្លឹមគន្លឹះនៃការស្រាវជ្រាវ និងពិសោធន៍។ ដូច្នេះត្រូវសរសេរខ្លឹមសារសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការងារពិសោធបច្ចុប្បន្ន និងខ្លឹមសារដែលស្រាវជ្រាវបន្តរបស់សិស្សឬការសិក្សាលើកក្រោយៗទៀតតែមិនបង្ហាញចម្លើយសិស្សទេ។



គំរូសន្លឹកកិច្ចការសិស្ស ដែលមិនសរសេរបញ្ចូលដំណើរការពិសោធន៍

ប្រធានបទ៖ អត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាស និងអង់ស៊ីមអាមីឡាស

សន្លឹកកិច្ចការ

បត្របំណង

- សង្កេតអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាសក្នុងកាតុរុក និងរឿមសត្វ
- សង្កេតអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមអាមីឡាស

ចំណេះដឹងមុនព្រះ

អង់ស៊ីម គឺជាម៉ូលេគុលដែលជួយលើកលែងប្រតិបត្តិការគីមីកម្រិតខ្ពស់ ហើយមានប្រតិបត្តិការប្រភេទ។ គ្រប់សារធាតុរាវទាំងអស់នៅក្នុងសារធាតុរាវ មិនអាចប្រតិបត្តិការបានទេ ប្រសិនបើមានអង់ស៊ីម។ អង់ស៊ីមទាំងអស់សុទ្ធតែជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសារធាតុរាវក្នុងក្រាមីនីយ៉ូប៊ែរកម្រិតខ្ពស់ប្រសិនបើមានប្រូតេអ៊ីនមួយចំនួនទៀត។ អង់ស៊ីមមួយអាចអាចរក្សាទុកទៅលើស៊ីប្រូតេអ៊ីនមួយចំនួន។

អង់ស៊ីមអាចធ្វើការងារនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ដូចជាអង់ស៊ីមកាតាឡាសនៅក្នុងកាតុរុក និងរឿមសត្វជាដើម មានទាំងប្រភេទស្រទាប់ស្រទាប់ផ្សេងៗទៀតដែលជាផលិតផលនៃការប្រតិបត្តិការសារធាតុរាវ។ រឿមសត្វជាដើម មានទាំងប្រភេទស្រទាប់ស្រទាប់ផ្សេងៗទៀតដែលជាផលិតផលនៃការប្រតិបត្តិការសារធាតុរាវ។ រឿមសត្វជាដើម មានទាំងប្រភេទស្រទាប់ស្រទាប់ផ្សេងៗទៀតដែលជាផលិតផលនៃការប្រតិបត្តិការសារធាតុរាវ។

អង់ស៊ីមអាចដំណើរការល្អបំផុតនៅសីតុណ្ហភាព 37°C ។ កាលណាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក អង់ស៊ីមនឹងបាត់បង់កម្រិតសកម្មភាព គឺថ្លុះថ្លាវិញនៅក្នុងស្ថានភាពស្រទាប់ស្រទាប់ផ្សេងៗទៀត ។ កំហាប់អង់ស៊ីមអាចខ្ពស់ ឬទាប ឬមានប្រតិបត្តិការល្អបំផុត កាលណាកំហាប់ស៊ីប្រូតេអ៊ីន ឬកំហាប់អង់ស៊ីមកាតាឡាសខ្ពស់បំផុតប្រតិបត្តិការល្អបំផុត។ លេខអង់ស៊ីមកំហាប់ស៊ីប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងគេ ឬទាបជាងគេ គឺជាប្រតិបត្តិការល្អបំផុត។

សំណួរគន្លឹះ



សម្មតិកម្ម

គេបំបំណែកវាជាប្រភេទអង់ស៊ីមកាតុរុក រឿមសត្វ ឬប្រភេទអង់ស៊ីមអាមីឡាស

ប្រភេទ	បំបំណែក	បំបំណែក	បំបំណែក	បំបំណែក
	កាតុរុក	កាតុរុក	កាតុរុក	កាតុរុក
អង់ស៊ីមកាតុរុក				
អង់ស៊ីមអាមីឡាស				

ប្លង់ពិសោធន៍


គេស្នើសុំឱ្យគិតគូរ/ពិសោធន៍

សម្ភារៈពិសោធន៍

.....

.....

ដំណើរការពិសោធន៍



.....

.....

.....

វិភាគលទ្ធផល

លទ្ធផល	បំបំណែក -ក-	បំបំណែក -ខ-	បំបំណែក -គ-	បំបំណែក -ឃ-
ល្បឿនប្រតិបត្តិការ				
លើកលែងចុះ				
ចំណេះដឹងមុន				

សន្និដ្ឋាន

.....

.....

សំណួរគន្លឹះ

១. ហេតុអ្វីបានជាយើងអាចដឹងបានអង់ស៊ីមអាមីឡាសបំបំណែកអង់ស៊ីមកាតុរុក ?

២. តើអ្នកកម្រើប្របណ្តាអង្គប្រតិបត្តិការពិសោធន៍ ? ហេតុអ្វីមានបញ្ហានោះកើតឡើង ?

ករណីគ្រូមានប្លង់ពិសោធន៍ នៅក្នុងសម្មតិកម្មនោះឱ្យសិស្សសរសេរដំណើរ

ដំណើរការពិសោធន៍ ផ្តល់ទៅតាមដំណាក់កាលហ្វឹកហាត់ និងបន្សំការគិតរបស់សិស្ស៖

ដំណាក់កាលដំបូង៖ សរសេរដំណើរការឱ្យទាំងអស់។

ដំណាក់កាលបន្ទាប់៖ ផ្តល់ជាប្លង់ពិសោធន៍។

ចុងក្រោយ៖ ឱ្យសិស្សគូរវាសប្លង់ពិសោធន៍ ឬសរសេរដំណើរការពិសោធន៍។

បម្រុងប្រយ័ត្នលើដំណើរការពិសោធអត្តសញ្ញាអង់ស៊ីមអាមីឡាស!
 ប្រសិនបើមិនមានអង់ស៊ីមអាមីឡាសទេ ការពិសោធនេះត្រូវផ្អាកសិនក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជម្ងឺកូវីដ ព្រោះវាត្រូវជំនួសដោយការប្រើទឹកមាត់!!!


- ករណីប្រើទឹកមាត់ជំនួសអង់ស៊ីមអាមីឡាស៖
១. ប្រយ័ត្នសិស្សមានជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើម ឬឆ្លងតាមទឹកមាត់ (ជំងឺថ្លើមជាដើម)
 ២. ត្រូវសម្អាតមាត់ធ្មេញមុនប្រើទឹកមាត់
 ៣. បរិមាណអង់ស៊ីមនៅក្នុងទឹកមាត់ ពីមនុស្សម្នាក់ៗ មិនដូចគ្នាទេ ។

របៀបលាយសូលុយស្យុងអាមីដុងសម្រាប់ប្រើ

ដំណើរការពិសោធន៍

- 1) រៀបចំបំពង់សាកចំនួន០៣ ដោយមានដាក់ស្លាកលើបំពង់សាកនីមួយៗរៀងគ្នា ក ខ គ ឬ 1 2 3
 - 2) បន្ទុកសូ.អាមីដុង 5គំណាក់ ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក» និង «ខ»
 - 3) បន្ទុកសូ.ស្ករ 5គំណាក់ ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក«គ»
 - 4) បន្ទុកសូ.អាមីឡាស 20គំណាក់ ចូលទៅក្នុងបំពង់សាក «ក»
 - 5) បន្ទុកទឹក 20គំណាក់ ចូលក្នុងបំពង់សាក «ខ» និង«គ»
 - 6) បន្ទាប់មកគ្រប់បំពង់សាកទាំងបីតិចៗរយៈពេល ០2នាទី
 - 7) បន្ទុក2គំណាក់នៃសូ.អ៊ីយ៉ូតចូលក្នុងបំពង់សាក «ក» «ខ» និង«គ» ច្រក្រវីឱ្យសព្វ
- *** សង្កេត និងកត់ត្រាលទ្ធផល

បើបង្កើនសូលុយស្យុង
 ទឹកមាត់ ត្រូវបន្ថែម ឱ្យស្មើគ្នា ។



ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកកិច្ចការពិសោធរបស់គ្រូ

ប្រធានបទ អត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាស និងអង់ស៊ីមអាមីឡាស

1. វត្ថុបំណង
 - សង្កេតអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាសក្នុងការ៉ុត និងថ្លើមសត្វ។
 - សង្កេតអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមអាមីឡាស។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

អង់ស៊ីមគឺជាកាតាលីករជីវៈជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីផ្សេងៗ ហើយមានប្រតិកម្មយថាប្រភេទ។ គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងសារពាង្គកាយមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ ប្រសិនបើគ្មានអង់ស៊ីម។ អង់ស៊ីមទាំងអស់សុទ្ធតែជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លា ដើម្បីបំបែកស៊ុបស្ត្រាតរាប់លានម៉ូលេគុលក្នុងមួយវិនាទី។ អង់ស៊ីមមួយមានអំពើតែទៅលើស៊ុបស្ត្រាតមួយប៉ុណ្ណោះ។

អង់ស៊ីមមានវត្តមាននៅក្នុងសរីរាង្គផ្សេងៗរបស់ការវស់ ដូចជាអង់ស៊ីមកាតាឡាសភាគច្រើនមាននៅក្នុងការ៉ុត ថ្លើមសត្វជាដើម មាននាទីបំបែកអ៊ីដ្រូសែនពេកអុកស៊ីតដែលជាផលិតផលមេតាបូលីសរបស់កោសិកា ដើម្បីការពារសារពាង្គកាយពីការយារយើរបស់មីក្រូសារពាង្គកាយ។ រីឯអង់ស៊ីមអាមីឡាស ផលិតដោយក្រពេញទឹកមាត់ និងលំពែង ហើយក៏រកឃើញមានតិចតួចនៅក្នុងរួសពោះវៀនតូច ចំណែករុក្ខជាតិមាននៅក្នុងសំបកផ្លែ ក្នុងគ្រាប់ (កូទីលេដូនរបស់គ្រាប់) និងមើមផងដែរ មាននាទីបម្លែងអាមីដុងទៅជាគ្លុយកូស (ស្ករងាយ ដែលកោសិកានៃសារពាង្គកាយអាចប្រើប្រាស់ជាប្រភពថាមពលបាន) ឬម៉ាល់តូស។ ក្រៅពីនេះ នៅមានវត្តមានអង់ស៊ីមសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសារពាង្គកាយការវស់។

អង់ស៊ីមមានដំណើរការល្អបំផុតនៅសីតុណ្ហភាព 37 °C ។ កាលណាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក ធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើសកម្មភាពអង់ស៊ីម ក៏ដូចគ្នាដែរលើស្ថិតក្នុងសូលុយស្យុងបាសខ្លាំងឬអាស៊ីតខ្លាំង។ កំហាប់អង់ស៊ីមមានឥទ្ធិពលលើល្បឿនប្រតិកម្ម៖ កាលណាកំហាប់ស៊ុបស្ត្រាត ឬកំហាប់អង់ស៊ីមកាន់តែខាប់ល្បឿនប្រតិកម្មកាន់តែលឿនឡើង។ ពេលខ្លះអង់ស៊ីមក៏ត្រូវការកូអង់ស៊ីមដែលភាគច្រើនជាវីតាមីន ឬជីវជាតិ ដើម្បីជួយក្នុងប្រតិកម្មគីមីដែរ។

3. ដំណើរការពិសោធន៍


៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើអង់ស៊ីមកាតាឡាស និងអង់ស៊ីមអាមីឡាសមានអត្តសញ្ញាណដូចម្តេច ?

៣.២ សម្មតិកម្ម

តេស្តវត្តមានអង់ស៊ីមកាតាឡាស

តើបំពង់សាកណាខ្លះមានប្រតិកម្មកើតឡើង ? តើក្រោយប្រតិកម្មនឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្លះ ?




រូប 3.14 វិធីតេស្តវត្តមានអង់ស៊ីមកាតាឡាស

លទ្ធផល	បំពង់សាក «ក»	បំពង់សាក «ខ»	បំពង់សាក «គ»	បំពង់សាក «ឃ»
ល្បឿនប្រតិកម្ម				
បរិមាណពពុះ				
ចំហេះភ្លើងជួប				

តេស្តវត្តមានអង់ស៊ីមអាមីឡាស
តើក្នុងបំពង់សាកនីមួយៗមានអ្វីកើតឡើង ?

បម្រែបម្រួលពណ៌		
បំពង់សាក «ក»	បំពង់សាក «ខ»	បំពង់សាក «គ»
សូលុយស្យុងអាមី ដុង+ សូលុស្យុងអ៊ីយ៉ូត	សូលុយស្យុងអាមីដុង+ អង់ស៊ីមអាមីឡាស +សូលុស្យុងអ៊ីយ៉ូត	សូលុយស្យុងអ៊ី យ៉ូត +សូលុយស្យុង ស្ករ



រូប 3.15 វិធីតេស្តវត្តមានអង់ស៊ីមកាតាឡាស

៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ «តេស្តវត្តមានអង់ស៊ីមកាតាឡាស»

បំពង់សាកចំនួន 04 ចង់ប្លាស្ទិក កៅស៊ូកង ស្ករក្រដាស ហ្វឺត កន្រ្តៃយ៍ ការ៉ុត ថ្លើមសត្វ កាំបិត តូច ជ្រុញ ថ្ម ឬគ្រួសតូចៗ អ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីត (H₂O₂) ធ្នូប ដែកកេះ។

ដំណើរការ

- រៀបចំបំពង់សាកចំនួន04ដោយមានដាក់ស្លាកលើបំពង់សាកនីមួយៗរៀងគ្នា ក ខ គ ឃ ឬ 1 2 3 4។
- កាត់ការ៉ុតជាដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា រួចដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក»។
- កាត់ថ្លើមសត្វជាដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា រួចដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ខ»។
- * * *បញ្ជាក់៖ បរិមាណនៃការ៉ុត និងថ្លើមសត្វត្រូវដាក់ស្មើគ្នា។
- ដាក់ដុំថ្មតូចៗ ចូលបំពង់សាក «គ» (ចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹងការ៉ុត និងថ្លើមដែរ)។
- ចាក់អ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីតចំណុះ 10ml ៗដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក» «ខ» «គ» «ឃ»រួចគ្រប ចង់ប្លាស្ទិក (តូច កៅស៊ូចងឱ្យជិត)។ សង្កេត និងកត់ត្រាលទ្ធផល។
- បន្ទាប់មកអុជធ្នូប រួចដាក់ចុងធ្នូបចូលក្នុងបំពង់សាកនីមួយៗក្នុងប្រវែងសមល្មមពីមាត់បំពង់សាក។
- សង្កេត និងកត់ត្រាលទ្ធផល។

សម្ភារពិសោធន៍ «តេស្តវត្តមានអង់ស៊ីមអាមីឡាស»

បំពង់សាកចំនួន 03 ស្ករក្រដាស ហ្វឺត កន្រ្តៃយ៍ សូលុយស្យុងអាមីឡាស (សូលុយស្យុងទឹកមាត់) សូលុយស្យុងអាមីដុង សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូត សូលុយស្យុងស្ករ (ទឹកស្ករ) ពីប៉ែត។

ដំណើរការពិសោធន៍

- រៀបចំបំពង់សាកចំនួនបីដោយមានដាក់ស្លាកលើបំពង់សាកនីមួយៗរៀងគ្នា ក ខ គ ឬ 1 2 3។
- បន្តក់សូលុយស្យុងអាមីដុងប្រាំតំណក់ ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក» និង «ខ»។
- បន្តក់សូលុយស្យុងស្ករ 5តំណក់ ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក«គ»។
- បន្តក់សូលុយស្យុងអាមីឡាស២០តំណក់ ចូលទៅក្នុងបំពង់សាក «ក»។

- បន្តក់ទឹក២០តំណក់ ចូលក្នុងបំពង់សាក «ខ» និង«គ»។
 - បន្ទាប់មកត្រូវបំពង់សាកទាំងបីតិចៗរយៈពេល២នាទី។
 - បន្តក់២តំណក់នៃសូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូតចូលក្នុងបំពង់សាក «ក» «ខ» និង«គ» រួចត្រូវឱ្យសព្វ។
- * * * សង្កេត និងកត់ត្រាលទ្ធផល។

៣.៤ (១) វិភាគលទ្ធផល

លទ្ធផល «តេស្តអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាស»

តារាង 3. 3 លក្ខណៈរបស់បំពង់សាកនីមួយៗនៃការពិសោធអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាស

លទ្ធផល	បំពង់សាក «ក»	បំពង់សាក «ខ»	បំពង់សាក «គ»	បំពង់សាក «ឃ»
ល្បឿនប្រតិកម្ម	ប្រតិកម្មខ្លាំង	ប្រតិកម្មខ្លាំង	គ្មាន	គ្មាន
បរិមាណពពុះ	មានពពុះ	មានពពុះ	គ្មាន	គ្មាន
ចំហេះភ្លើងធូប	ចំហេះខ្លាំង	ចំហេះខ្លាំង	គ្មាន	គ្មាន

សម្មតិកម្មដែលបំពង់សាក «ក» និង«ខ» មានប្រតិកម្ម មានពពុះ និងចំហេះឆេះចេញជាភ្លើងឡើង ត្រូវបានគាំទ្រដោយពិសោធន៍។ តាមទ្រឹស្តី អង់ស៊ីមកាតាឡាសបំបែកអ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីត ហើយបានបង្ហាញតាមរយៈការសង្កេតឃើញនៅក្នុងពិសោធន៍ដូចជា ប្រតិកម្ម និងលទ្ធផលនៃពពុះ និងចំហេះនៃឧស្ម័ន (O₂) ។ ដូច្នោះ នៅក្នុងថ្លើមសត្វ និងការរុំតមានវត្តមានអង់ស៊ីមកាតាឡាស ចំណែកឯគ្រួស ឬថ្ម មិនមានវត្តមានអង់ស៊ីមកាតាឡាសទេ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អង់ស៊ីមកាតាឡាសមានវត្តមាននៅក្នុងថ្លើមសត្វ និងក្នុងការរុំត ដែលជាការវេសឯការគ្មានជីវិតមិនមានវត្តមានអង់ស៊ីមកាតាឡាសទេ (តារាង 3.3)។

៣.៥ (១) សន្និដ្ឋាន

តាមរយៈការពិសោធន៍ អង់ស៊ីមកាតាឡាសមានវត្តមាននៅក្នុងការវេស ។ វត្តមានរបស់អង់ស៊ីមកាតាឡាស ធ្វើឱ្យកើតមានប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែន ហើយទទួលបានឧស្ម័នអុកស៊ីសែន។

៣.៤ (២) វិភាគលទ្ធផល

លទ្ធផល «តេស្តអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមអាមីឡាស»

តារាង 3. 4 លក្ខណៈបំពង់សាកនីមួយៗនៃការពិសោធអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមអាមីឡាស

ពណ៌		
បំពង់សាក «ក»	បំពង់សាក «ខ»	បំពង់សាក «គ»
សូលុយស្យុងអាមីដ៊ីង+សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូត	សូលុយស្យុងអាមីដ៊ីង+អង់ស៊ីមអាមីឡាស+សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូត	សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូត+សូលុយស្យុងស្ករ
ពណ៌ខៀវស្វាយ	ពណ៌របស់សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូត	ពណ៌សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូត

សម្មតិកម្មដែលបំពង់សាក «ខ» មានពណ៌សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូតត្រូវបានគាំទ្រដោយពិសោធន៍។ តាមទ្រឹស្តី អង់ស៊ីមអាមីឡាសបំបែកអាមីដ៊ីងឱ្យទៅជាស្ករដោយ ឬគ្រួសកូស ត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈការសង្កេតឃើញនៅក្នុងពិសោធន៍ ដោយ អត្តសញ្ញាណអាមីដ៊ីងដែលក្រោយពីបន្តក់សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូតប្រែជា

ពណ៌ខៀវស្វាយ ប៉ុន្តែបំពង់សាក «ខ» ក្រោយពេលបន្តកំសុលុយស្បូងអង្កុយត វានៅតែរក្សាពណ៌ របស់ស្បូងអង្កុយតដដែល ដោយសារតែម៉ូលេគុលអាមីដុងបានបំបែកដោយអង់ស៊ីម អាមីឡាស (តារាង 3.4)។

៣.៥ (២) សន្និដ្ឋាន

តារាង:ការពិសោធន៍ កំណត់ថាវត្តមានរបស់អង់ស៊ីមអាមីឡាស ម៉ូលេគុលអាមីដុងត្រូវបាន បំបែកទៅជាម៉ូលេគុលស្តរងាយ ដែលធ្វើឱ្យម៉ូលេគុលអាមីដុងមិនអាចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពេលមាន វត្តមានអង្កុយត។

សំណួរត្រិះរិះ

១) ហេតុអ្វីបានជាអង់ស៊ីមកាតាឡាស និងអង់ស៊ីមអាមីឡាសមានអត្តសញ្ញាណខុសគ្នា ?

.....
.....

២) តើអង់ស៊ីមកាតាឡាសមានលទ្ធភាពបំបែកអាមីដុងដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?

.....
.....

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្និកម្មការពិសោធន៍របស់សិស្ស

ប្រធានបទ អត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាស និងអង់ស៊ីមអាមីឡាស

1. វត្ថុបំណង

- សង្កេតអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាសក្នុងការ៉ុត និងថ្លើមសត្វ។
- សង្កេតអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមអាមីឡាស ។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

អង់ស៊ីម គឺជាកាតាលីករជីវៈដែលជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីផ្សេងៗ ហើយមានប្រតិកម្មថា ប្រភេទ។ គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងសារពាង្គកាយ មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ ប្រសិនបើគ្មានអង់ ស៊ីម។ អង់ស៊ីមទាំងអស់សុទ្ធតែជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដើម្បីបំបែកស៊ុប ស្រ្តាតរាប់លានម៉ូលេគុលក្នុងមួយវិនាទី។ អង់ស៊ីមមួយមានអំពើតែទៅលើស៊ុបស្រ្តាតមួយប៉ុណ្ណោះ។

អង់ស៊ីមមានវត្តមាននៅក្នុងសរីរាង្គផ្សេងៗរបស់ការវស់ ដូចជាអង់ស៊ីមកាតាឡាសភាគច្រើន មាននៅក្នុងការ៉ុត ថ្លើមសត្វជាដើម មាននាទីបំបែកអ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីតដែលជាផលិតផលមេតាបូលីស របស់កោសិកា ដើម្បីការពារសារពាង្គកាយពីការយារយឺរបស់មីក្រូសារពាង្គកាយ។ រីឯអង់ស៊ីមអាមីឡា សផលិតដោយក្រពេញទឹកមាត់ និងលំពែងហើយក៏រកឃើញមានតិចតួចនៅក្នុងរួសពោះវៀនតូច ចំណែករុក្ខជាតិមាននៅក្នុងសំបកផ្លែ ក្នុងគ្រាប់ (កូទីលេដូនរបស់គ្រាប់) និងមើមផងដែរ មាននាទីប ម្លែងអាមីដុងទៅជាគ្លុយកូស (ស្តរងាយ ដែលកោសិកានៃសារពាង្គកាយអាចប្រើប្រាស់ជាប្រភព ថាមពលបាន) ឬម៉ាល់តូស។ ក្រៅពីនេះនៅមានវត្តមានអង់ស៊ីមសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុង សារពាង្គកាយការវស់ ។


អង់ស៊ីមមានដំណើរការល្អបំផុតនៅសីតុណ្ហភាព 37°C ។ កាលណាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក ធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើសកម្មភាពអង់ស៊ីម ក៏ដូចគ្នាដែរលើស្ថិតក្នុងសូលុយស្យុងបាសខ្លាំងឬអាស៊ីតខ្លាំង។ កំហាប់អង់ស៊ីមមានឥទ្ធិពលលើល្បឿនប្រតិកម្ម៖ កាលណាកំហាប់ស៊ុបស្ត្រាត ឬកំហាប់អង់ស៊ីមកាន់តែខាប់ល្បឿនប្រតិកម្មកាន់តែលឿនឡើង។ ពេលខ្លះអង់ស៊ីមក៏ត្រូវការកូអង់ស៊ីមដែលភាគច្រើនជាវីតាមីន ឬជីវជាតិ ដើម្បីជួយក្នុងប្រតិកម្មគីមីដែរ។

3. សំណួរគន្លឹះ

4. សម្មតិកម្ម

តេស្តវត្តមានអង់ស៊ីមកាតាឡាស

តើបំពង់សាកណាខ្លះមានប្រតិកម្មកើតឡើង? តើក្រោយប្រតិកម្មនឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្លះ?




លទ្ធផល	បំពង់សាក «ក»	បំពង់សាក «ខ»	បំពង់សាក «គ»	បំពង់សាក «ឃ»
ល្បឿនប្រតិកម្ម				
បរិមាណពុះ				
ចំហេះភ្លើងធូប				

តេស្តវត្តមានអង់ស៊ីមអាមីឡាស

តើក្នុងបំពង់សាកនីមួយៗមានអ្វីកើតឡើង?

បម្រែបម្រួលពណ៌		
បំពង់សាក «ក»	បំពង់សាក «ខ»	បំពង់សាក «គ»
សូ.អាមីឡាស + សូ.អ៊ុយរេត	សូ.អាមីឡាស + អង់ស៊ីមអាមីឡាស + សូ.អ៊ុយរេត	សូ.អ៊ុយរេត + សូ.ស្ករ



ដំណើរការ

- រៀបចំបំពង់សាកចំនួន 04 ដោយមានដាក់ស្លាកលើបំពង់សាកនីមួយៗរៀងគ្នា ក ខ គ ឃ ឬ 1 2 3 4 ។
- កាត់ការ៉ុតជាដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា រួចដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក» ។
- កាត់ថ្លើមសត្វជាដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា រួចដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ខ» ។
* * * បញ្ជាក់៖ បរិមាណនៃការ៉ុត និងថ្លើមសត្វត្រូវដាក់ស្មើគ្នា។
- ដាក់ដុំថ្មចូចៗ ចូលបំពង់សាក «គ» (ចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹងការ៉ុត និងថ្លើមដែរ) ។

- ចាក់អ៊ីដ្រូសែនពេញស៊ីតចំណុះ 10 ml ៗ ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក» «ខ» «គ» «ឃ» រួចគ្របដាច់បញ្ជីស្លឹក (គួប កៅស៊ូចងឱ្យជិត)។ សង្កេត និងកត់ត្រាលទ្ធផល។
- បន្ទាប់មកអុជធ្មប រួចដាក់ចុងធ្មបចូលក្នុងបំពង់សាកនីមួយៗក្នុងប្រអែងសមល្មមពីមាត់បំពង់សាក។ សង្កេត និងកត់ត្រាលទ្ធផល។

សម្ភារ «តេស្តវត្តមានអង់ស៊ីមអាមីឡាស»

បំពង់សាកចំនួន 03 ស្កុតក្រដាស ហ្វឺត កន្រ្តៃ សូលុយស្យុងអាមីឡាស (សូលុយស្យុងទឹកមាត់) សូលុយស្យុងអាមីដុង សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូត សូលុយស្យុងស្ករ (ទឹកស្ករ) ពីប៉ែត។

ដំណើរការ

- រៀបចំបំពង់សាកចំនួន 03 ដោយមានដាក់ស្លាកលើបំពង់សាកនីមួយៗរៀងគ្នា ក ខ គ ឬ 1 2 3។
 - បន្តក់សូលុយស្យុងអាមីដុង ២ តំណក់ ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក» និង «ខ»។
 - បន្តក់សូលុយស្យុងស្ករ 2 តំណក់ ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «គ»។
 - បន្តក់សូលុយស្យុងអាមីឡាស 15 ml ចូលទៅក្នុងបំពង់សាក «ក»។
 - បន្តក់ទឹក 15ml ចូលក្នុងបំពង់សាក «ខ» និង «គ»។
 - បន្ទាប់មកគ្រឿងបំពង់សាកទាំងបីតិចៗរយៈពេល 02 នាទី។
 - បន្តក់ 02 តំណក់នៃសូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូតចូលក្នុងបំពង់សាក «ក» «ខ» និង «គ» រួចគ្រឿងឱ្យសព្វ។
- * * * សង្កេត និងកត់ត្រាលទ្ធផល

6. (១) វិភាគលទ្ធផល

លទ្ធផល «តេស្តអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមកាតាឡាស»

លទ្ធផល	បំពង់សាក «ក»	បំពង់សាក «ខ»	បំពង់សាក «គ»	បំពង់សាក «ឃ»
ល្បឿនប្រតិកម្ម				
បរិមាណពុះ				
ចំហេះភ្លើងធ្មប				

7. (១) សន្និដ្ឋាន

6. (២) វិភាគលទ្ធផល

លទ្ធផល «តេស្តអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីមអាមីឡាស»

បម្រែបម្រួលពណ៌		
បំពង់សាក «ក»	បំពង់សាក «ខ»	បំពង់សាក «គ»
សូលុយស្យុងអាមីដុង+សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូត	សូលុយស្យុងអាមីដុង+អង់ស៊ីមកាតាឡាស+សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូត	សូលុយស្យុងស្ករ + សូលុយស្យុងអ៊ីយ៉ូត

៣. ដំណើរការពិសោធន៍

ត្រូវដាក់ក្លាសេឱ្យត្រជាក់

សម្ភារៈពិសោធន៍ ៖

បំពង់សាកចំនួន០១ឬកែវប្លាស្ទិក សុតក្រដាស ហ្វឺត កន្ត្រៃយ៍ កាត់ត្រជាក់ខ្លាំងឬកក ថ្លើមសត្វត្រជាក់ខ្លាំង ឬកក កាត់ដាក់ក្នុងសីតុ.១០០°C ថ្លើមសត្វដាក់ក្នុងសីតុ.១០០°C កាត់នៅសីតុ.ធម្មតា ថ្លើមសត្វនៅសីតុ. ធម្មតា កាំបិតតូច អ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីត (H₂O₂) ។

សរសេររបាយការណ៍បានក្នុងករណី កាត់ស្បែករួច តែបើមិនទាន់ ស្បែកទេ ត្រូវសរសេររបៀបនូវឆ្នាំង និងចង្រ្កាន ឬកំសៀវទឹក

ផ្នែកទី២ ៖ សន្លឹកអិច្វិការពិសោធន៍របស់គ្រូ

ប្រធានបទ សង្កេតឥទ្ធិពលសីតុណ្ហភាពលើសកម្មភាពអង់ស៊ីមកាតាឡាស

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតឥទ្ធិពលសីតុណ្ហភាពលើសកម្មភាពអង់ស៊ីមកាតាឡាសក្នុងកាត់ និងថ្លើមសត្វក្នុង ប្រតិកម្មបំបែកអ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីត (H₂O₂) ឬហៅថាទឹកអុកស៊ីសែន ឬទឹកលាងរឫស។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

អង់ស៊ីម គឺជាកាតាលីករជីវៈដែលជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីផ្សេងៗ ហើយមានប្រតិកម្មយថា ប្រភេទ។ គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងសារពាង្គកាយ មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ ប្រសិនបើគ្មានអង់ ស៊ីម។ អង់ស៊ីមទាំងអស់សុទ្ធតែជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លា ដើម្បីបំបែកស៊ុប ស្រ្តាតរាប់លានម៉ូលេគុលក្នុងមួយវិនាទី។ អង់ស៊ីមមួយមានអំពើតែទៅលើស៊ុបស្រ្តាតមួយប៉ុណ្ណោះ។

អង់ស៊ីមមានវត្តមាននៅក្នុងសរីរាង្គផ្សេងៗរបស់ការវស់ដូចជាអង់ស៊ីមកាតាឡាសភាគច្រើន មាននៅក្នុងកាត់ ថ្លើមសត្វជាដើម មាននាទីបំបែកអ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីតដែលជាផលិតផលមេតាបូលីស របស់កោសិកាដើម្បីការពារសារពាង្គកាយពីការយារយើរបស់មីក្រូសារពាង្គកាយ។ រីឯអង់ស៊ីមអាមីឡាស ផលិតដោយក្រពេញទឹកមាត់ និងលំពែង ហើយក៏រកឃើញមានតិចតួចនៅក្នុងរួសពោះរៀនតូច ចំណែករុក្ខជាតិមាននៅក្នុងសំបកផ្លែ ក្នុងគ្រាប់ (កូទីលេដូនរបស់គ្រាប់) និងមើមផងដែរ មាននាទីប ម្លែងអាមីដុងទៅជាគ្លុយកូស (ស្ករងាយ ដែលកោសិកានៃសារពាង្គកាយអាចប្រើប្រាស់ជាប្រភព ថាមពលបាន) ឬម៉ាល់តូស។ ក្រៅពីនេះ នៅមានវត្តមានអង់ស៊ីមសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុង សារពាង្គកាយការវស់។

អង់ស៊ីមមានដំណើរការល្អបំផុតនៅសីតុណ្ហភាព 37°C។ កាលណាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក ឬ ទាបពេក ធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើសកម្មភាពអង់ស៊ីម ក៏ដូចគ្នាដែរលើស្ថិតក្នុងសូលុយស្យុងបានខ្លាំង ឬអាស៊ីតខ្លាំង។ កំហាប់អង់ស៊ីម មានឥទ្ធិពលលើល្បឿនប្រតិកម្ម៖ កាលណាកំហាប់ស៊ុបស្រ្តាត ឬកំហា បំអង់ស៊ីមកាន់តែខាប់ល្បឿនប្រតិកម្មកាន់តែលឿនឡើង។ ពេលខ្លះអង់ស៊ីមក៏ត្រូវការកូអង់ស៊ីមដែល ភាគច្រើនជាវីតាមីន ឬជីជាតិ ដើម្បីជួយក្នុងប្រតិកម្មគីមីដែរ។


3. ដំណើរការពិសោធន៍

៣.១ សំណួរគន្លឹះ

តើសីតុណ្ហភាពមានឥទ្ធិពលដូចម្តេចទៅលើអង់ស៊ីមកាតាឡាស?

៣.២ សម្មតិកម្ម

តើបំពង់សាកណាខ្លះមានប្រតិកម្មកើតឡើង? តើសកម្មភាពអង់ស៊ីមកើតឡើងដូចម្តេច?



រូប 3.16 វិធីសង្កេតសកម្មភាពអង់ស៊ីមកាតាឡាស

លទ្ធផល	H ₂ O ₂	បំពង់ សាក «ក.១»	បំពង់ សាក «ក.២»	បំពង់ សាក «ខ.១»	បំពង់ សាក «ខ.២»	បំពង់ សាក «គ.១»	បំពង់ សាក «គ.២»
សកម្មភាព អង់ស៊ីម	ពេលចាក់ចូលភ្លាម						
	១នាទី						
	២នាទី						
	ក្រោយ៥នាទី						

៣.៣ ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

បំពង់សាកចំនួន០៦ឬកែវញ្ជាស្លឹក ស្ករក្រដាស ហ្វឺត កន្សែយ កាតែត្រជាក់ខ្លាំងឬកក ថ្លើមសត្វត្រជាក់ខ្លាំងឬកក កាតែដាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាព 100°C ថ្លើមសត្វដាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាព 100°C កាតែនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា ថ្លើមសត្វនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា កាំបិតតូច ជ្រូញ អ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីត (H₂O₂)។

ដំណើរការ

- រៀបចំបំពង់សាកចំនួន ០៦ ដោយមានដាក់ស្លាកសម្គាល់លើបំពង់សាកនីមួយៗរៀងគ្នា ក_១ ក_២ ខ_១ ខ_២ គ_១ គ_២។
- យកកាតែដុតរួចប៉ុនៗគ្នា ដែលដាក់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំង ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក_១»។

- យកថ្លើមសត្វដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា ដែលដាក់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំង ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក២»។
- យកការ៉ុតនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា ដែលមានដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ខ១»។
- យកថ្លើមសត្វនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា ដែលមានដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ខ២»។
- យកការ៉ុតដែលបានកាត់ជាដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (100°C) ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «គ១»។
- យកថ្លើមសត្វដែលបានកាត់ជាដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា សីតុណ្ហភាពខ្ពស់(100°C) ចូលក្នុងបំពង់សាក «គ២»។

* * *បញ្ជាក់៖ ការ៉ុត និងថ្លើមសត្វត្រូវដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាកបរិមាណស្មើៗគ្នា។

- ចាក់អ៊ីដ្រូសែនពេមុកស៊ីតចូលក្នុងកែវចូលគ្រប់បំពង់សាកក្នុងចំណុះ 10ml ស្មើៗគ្នា។ សង្កេតសកម្មភាពអង់ស៊ីម និងកត់ត្រាលទ្ធផល។

៣.៤ វិភាគលទ្ធផល

លទ្ធផល

តារាង 3. 5 លក្ខណៈនៃប្រតិកម្មរបស់អង់ស៊ីមនៅក្នុងបំពង់សាកនីមួយៗ។

លទ្ធផល	H ₂ O ₂	បំពង់សាក «ក.១»	បំពង់សាក «ក.២»	បំពង់សាក «ខ.១»	បំពង់សាក «ខ.២»	បំពង់សាក «គ.១»	បំពង់សាក «គ.២»
សកម្មភាពអង់ស៊ីម	ពេលចាក់ចូលភ្លាម	គ្មានសកម្មភាព	គ្មានសកម្មភាព	ប្រតិកម្មលឿន	ប្រតិកម្មលឿន	គ្មានប្រតិ.	គ្មានប្រតិ.
	១នាទី	ប្រតិ.លឿន	ប្រតិ.យឺត	ប្រតិ.លឿនខ្លាំង	ប្រតិ.លឿនខ្លាំង	គ្មានប្រតិ.	គ្មានប្រតិ.
	២នាទី	ប្រតិ.លឿនខ្លាំង	ប្រតិ.លឿន	ប្រតិ.ថយចុះ	ប្រតិ.ថយចុះ	គ្មានប្រតិ.	គ្មានប្រតិ.
	ក្រោយ៥នាទី	ប្រតិ. ថយចុះ	ប្រតិ.លឿនខ្លាំងបន្ទាប់មកខ្សោយ	ប្រតិ. ថយចុះជាមុន	ប្រតិ. ថយចុះជាងមុន	គ្មានប្រតិ.	គ្មានប្រតិ.

តាមលទ្ធផលពិសោធខាងលើបង្ហាញថា៖

- អង់ស៊ីមកាតាឡាសនៅសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ត្រូវបានបង្ហាត់សកម្មភាព ប៉ុន្តែនៅពេលសីតុណ្ហភាពត្រឡប់មកធម្មតាវិញនោះសកម្មភាពអង់ស៊ីមនឹងសកម្មមកវិញ។
- អង់ស៊ីមកាតាឡាសនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (100°C) ត្រូវបានខូចទាំងស្រុង។
- អង់ស៊ីមកាតាឡាសនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតាមានសកម្មភាពលឿន-ខ្លាំង។

៣.៥ សន្និដ្ឋាន

នៅសីតុណ្ហភាពទាប អង់ស៊ីមអាចនឹងបង្ហាត់សកម្មភាព(មិនមានប្រតិកម្ម) តែវានឹងមានសកម្មភាពមកវិញនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពរបស់វាត្រឡប់មកភាពប្រក្រតីវិញ ផ្ទុយទៅវិញអង់ស៊ីមនឹងខូច ឬគ្មានសកម្មភាពទាំងស្រុងនៅពេលវាស្ថិតក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក (អាចចាប់ពី 100°C ឡើងទៅ)។ ដូច្នេះអង់ស៊ីមមានសកម្មភាព ល្អក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតា។

សំណួរត្រិះរិះ

១) ហេតុអ្វីសីតុណ្ហភាពមានឥទ្ធិពលលើសកម្មភាពអង់ស៊ីម ?

.....

២) តើអង់ស៊ីមនៅក្នុងសារពាង្គកាយការវាស់មានអត្ថប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ ?

.....

ផ្នែកទី៣ ៖ សន្និកម្មការពិសោធរបស់សិស្ស

ប្រធានបទ សង្កេតឥទ្ធិពលសីតុណ្ហភាពលើសកម្មភាពអង់ស៊ីមកាតាឡាស

1. វត្ថុបំណង

សង្កេតឥទ្ធិពលសីតុណ្ហភាពលើសកម្មភាពអង់ស៊ីមកាតាឡាសក្នុងការ៉ុត និងថ្លើមសត្វក្នុងប្រតិកម្មបំបែកអ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីត (H₂O₂) ឬហៅថាទឹកអុកស៊ីសែន ឬទឹកលាងរឫស។

2. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

អង់ស៊ីម គឺជាកាតាលីករជីវៈដែលជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីផ្សេងៗ ហើយមានប្រតិកម្មយថាប្រភេទ។ គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងសារពាង្គកាយ មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ ប្រសិនបើគ្មានអង់ស៊ីម។ អង់ស៊ីមទាំងអស់សុទ្ធតែជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដើម្បីបំបែកស៊ុបស្ត្រាតរាប់លានម៉ូលេគុលក្នុងមួយវិនាទី។ អង់ស៊ីមមួយមានអំពើតែទៅលើស៊ុបស្ត្រាតមួយប៉ុណ្ណោះ។

អង់ស៊ីមមានវត្តមាននៅក្នុងសរីរាង្គផ្សេងៗរបស់ការវាស់ ដូចជាអង់ស៊ីមកាតាឡាសភាគច្រើនមាននៅក្នុងការ៉ុត ថ្លើមសត្វជាដើម មាននាទីបំបែកអ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីតដែលជាផលិតផលមេតាបូលីសរបស់កោសិកាដើម្បីការពារសារពាង្គកាយពីការយារយីរបស់មីក្រូសារពាង្គកាយ។ រីឯអង់ស៊ីមអាមីឡាសផលិតដោយក្រពេញទឹកមាត់ និងលំពែង ហើយក៏រកឃើញមានតិចតួចនៅក្នុងរុសពោះរៀនតូច។ ចំណែករុក្ខជាតិមាននៅក្នុងសំបកផ្លែ ក្នុងគ្រាប់ (កូទីលេដូនរបស់គ្រាប់) និងមើមផងដែរ។ វាមាននាទីបម្លែងអាមីដុងទៅជាគ្លុយកូស (ស្ករងាយ ដែលកោសិកានៃសារពាង្គកាយអាចប្រើប្រាស់ជាប្រភព


ថាមពលបាន) ឬម៉ាល់តូស។ ក្រៅពីនេះ នៅមានវត្តមានអង់ស៊ីមសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសារពាង្គកាយការវស់ ។

អង់ស៊ីមមានដំណើរការល្អបំផុតនៅសីតុណ្ហភាព 37°C។ កាលណាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬទាបពេក ធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើសកម្មភាពអង់ស៊ីមក៏ដូចគ្នាដែរ បើស្ថិតក្នុងសូលុយស្យុងបាសខ្លាំងឬអាស៊ីតខ្លាំង។ កំហាប់អង់ស៊ីមមានឥទ្ធិពលលើល្បឿនប្រតិកម្ម៖ កាលណាកំហាប់ស៊ុបស្ត្រាត ឬកំហាប់អង់ស៊ីមកាន់តែខាប់ល្បឿនប្រតិកម្មកាន់តែលឿនឡើង។ ពេលខ្លះអង់ស៊ីមក៏ត្រូវការកូអង់ស៊ីមដែលភាគច្រើនជាវីតាមីន ឬដីវីជាតិ ដើម្បីជួយក្នុងប្រតិកម្មគីមីដែរ ។

3. សំណួរគន្លឹះ

4. សម្មតិកម្ម

តើបំពង់សាកណាខ្លះមានប្រតិកម្មកើតឡើង? តើសកម្មភាពអង់ស៊ីមកើតឡើងដូចម្តេច?



លទ្ធផល	H ₂ O ₂	បំពង់សាក «ក.១»	បំពង់សាក «ក.២»	បំពង់សាក «ខ.១»	បំពង់សាក «ខ.២»	បំពង់សាក «គ.១»	បំពង់សាក «គ.២»
សកម្មភាពអង់ស៊ីម	ពេលចាក់ចូលភ្លាម						
	១នាទី						
	២នាទី						
	ក្រោយ៥នាទី						

5. ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

បំពង់សាកចំនួន០៦ ឬកែវប្លាស្ទិក ស្ករក្រដាស ហ្វឺត កន្ត្រៃយ៍ កាវ៉ុតត្រជាក់ខ្លាំង ឬកក ថ្លើមសត្វត្រជាក់ខ្លាំង ឬកក កាវ៉ុតដាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាព 100 °C ថ្លើមសត្វដាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាព 100

°C ការុតនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា ឆ្លើមសត្វនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា កាំបិតតូច ជ្រុញ អ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីត (H₂O₂)។

ដំណើរការ

- រៀបចំបំពង់សាកចំនួន ០៦ ដោយមានដាក់ស្លាកសម្គាល់លើបំពង់សាកនីមួយៗរៀងគ្នា ក_១ ក_២ ខ_១ ខ_២ គ_១ គ_២។
- យកការុតដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា ដែលដាក់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំង ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក_១»
- យកឆ្លើមសត្វដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា ដែលដាក់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំង ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ក_២»
- យកការុតនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា ដែលមានដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ខ_១»
- យកឆ្លើមសត្វនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា ដែលមានដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «ខ_២»
- យកការុតដែលបានកាត់ជាដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (100°C) ដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាក «គ_១»
- យកឆ្លើមសត្វដែលបានកាត់ជាដុំតូចៗប៉ុនៗគ្នា សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (100°C) ចូលក្នុងបំពង់សាក «គ_២»។
- * * *បញ្ជាក់៖ ការុត និងឆ្លើមសត្វត្រូវដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាកបរិមាណស្មើៗគ្នា។
- ចាក់អ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីតចូលក្នុងកែវចូលគ្រប់បំពង់សាកក្នុងចំណុះ 10 ml ស្មើៗគ្នា។ សង្កេតសកម្មភាពអង់ស៊ីម និងកត់ត្រាលទ្ធផល។

6. វិភាគលទ្ធផល

លទ្ធផលសង្កេត

លទ្ធផល	H ₂ O ₂	បំពង់សាក «ក.១»	បំពង់សាក «ក.២»	បំពង់សាក «ខ.១»	បំពង់សាក «ខ.២»	បំពង់សាក «គ.១»	បំពង់សាក «គ.២»
សកម្មភាព (ប្រតិកម្ម) អង់ស៊ីម	ពេលចាក់ចូលភ្លាម						
	១នាទី						
	២នាទី						
	ក្រោយ ៥នាទី						

7. សន្និដ្ឋាន

.....
.....

សំណួរត្រិះរិះ

១) ហេតុអ្វីសីតុណ្ហភាពមានឥទ្ធិពលលើសកម្មភាពអង់ស៊ីម?

.....

២) តើអង់ស៊ីមនៅក្នុងសារពាង្គកាយការវេសមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ?

.....
.....

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរួម

តាមរយៈប្រធានបទពិសោធន៍ទាំងដប់ប្រាំខាងលើ ដែលបានជ្រើសរើសចេញពីសៀវភៅសិក្សាគោលដីវិទ្យារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា គឺជាឯកសារជំនួយស្នារតីដ៏សំខាន់មួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងបង្រៀនមុខវិជ្ជាដីវិទ្យានៅតាមវិទ្យាល័យនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ដំណើរការ និងលទ្ធផលពិសោធភាគច្រើន បានធ្វើការពិសោធឡើងវិញច្រើនដង ហើយបានបង្ហាញថាលទ្ធផលខ្លះមានភាពលម្អៀងតិចតួចទៅនឹងទ្រឹស្តីដែលមានស្រាប់ ហើយលទ្ធផលនៃការពិសោធតិចតួច ជាលទ្ធផលចាស់។ ហេតុដូច្នេះ ការធ្វើពិសោធច្រើនដងនាពេលបន្តបន្ទាប់ទៀត គឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើបន្ត ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងកាត់បន្ថយភាពលម្អៀងនៃទ្រឹស្តី។ ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រប់វិធីសាស្ត្រពិសោធន៍ លទ្ធផល និងសេចក្តីណែនាំពិសោធន៍ជាលំនាំមួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដែលត្រូវដឹកនាំសិស្សានុសិស្សធ្វើពិសោធប្រតិបត្តិទាំងនៅក្នុងថ្នាក់រៀន និងនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ផ្ទាល់។ ទោះបីជាលទ្ធផលពិសោធមិនមានសភាពសុក្រឹតមួយរយភាគរយ ទៅនឹងទ្រឹស្តីក៏ដោយ ក៏សកម្មភាពដឹកនាំសិស្សានុសិស្សធ្វើពិសោធរបស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បានផ្តល់នូវលំនាំនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការធ្វើពិសោធយ៉ាងល្អដល់ពួកគេ។ ហេតុដូច្នេះ សូមលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នាំសិស្សានុសិស្សធ្វើពិសោធឱ្យបានច្រើន។

គន្ថនិទ្ទេស

1. ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា សៀវភៅសិក្សាគោលដីវិទ្យាថ្នាក់ទី១០។
2. ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា សៀវភៅសិក្សាគោលដីវិទ្យាថ្នាក់ទី១១។
3. ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា សៀវភៅសិក្សាគោលដីវិទ្យាថ្នាក់ទី១២។
4. ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅ។
5. ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ។
6. ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ។
7. [https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biotechnology/Bio_OER_\(CUNY\)/03%3A_Quantitative_Determinations/3.06%3A_Enzyme_Kinetics_\(Activity\).](https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biotechnology/Bio_OER_(CUNY)/03%3A_Quantitative_Determinations/3.06%3A_Enzyme_Kinetics_(Activity).)
8. [https://en.wikipedia.org/wiki/Amylase.](https://en.wikipedia.org/wiki/Amylase)
9. [Effect of Temperature on Enzymatic Reaction, https://www.creative-enzymes.com/resource/effect-of-temperature-on-enzymatic-reaction_50.html.](https://www.creative-enzymes.com/resource/effect-of-temperature-on-enzymatic-reaction_50.html)
10. [https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-biology-flexbook-2.0/section/2.9/primary/lesson/plant-cell-structures-bio/\).](https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-biology-flexbook-2.0/section/2.9/primary/lesson/plant-cell-structures-bio/)
11. [https://www.jotscroll.com/forums/3/posts/217/animal-cell-structure-model-organelles-cell-parts-labeled-diagram.html#Vacuole\).](https://www.jotscroll.com/forums/3/posts/217/animal-cell-structure-model-organelles-cell-parts-labeled-diagram.html#Vacuole)
12. [https://microbenotes.com/animal-cell-definition-structure-parts-functions-and-diagram/.](https://microbenotes.com/animal-cell-definition-structure-parts-functions-and-diagram/)
13. <https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-biology-flexbook-2.0/section/2.9/>
14. [https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-biology-flexbook-2.0/section/2.9/primary/lesson/plant-cell-structures-bio/\).](https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-biology-flexbook-2.0/section/2.9/primary/lesson/plant-cell-structures-bio/)
15. [https://valleymicroscope.com/product/acg055-general-animal-cell/.](https://valleymicroscope.com/product/acg055-general-animal-cell/)
16. [https://biologydictionary.net/do-protists-have-a-nucleus/.](https://biologydictionary.net/do-protists-have-a-nucleus/)
17. [https://byjus.com/biology/amoeba/.](https://byjus.com/biology/amoeba/)
18. [https://www.dreamstime.com/paramecium-microscopic-closeup-structure-anatomical.](https://www.dreamstime.com/paramecium-microscopic-closeup-structure-anatomical)
19. [https://www.agcled.com/blog/how-led-grow-light-help-the-growth-of-plants.html.](https://www.agcled.com/blog/how-led-grow-light-help-the-growth-of-plants.html)